




47182/B

Amer. R. m.



1817

E. Volke

F. Meyer 1817.

D. IO. DAVIDIS SCHOEPP

SEREN. MARGGRAV. BRAND. ONOLD. ET CVLME.

MED. AVL. ET MILIT. COLL. MED.

MEMBR.

MATERIA
MEDICA
AMERICANA

POTISSIMUM
REGNI VEGETABILIS.




ERLANGAE
SVMTIBVS IO. IAC. PALMII
MDCCLXXXVII.

Ne sylvae quidem, horridiorque Naturae facies Medicinis carent, sacra illa Parente rerum omnium nusquam non remedia disponente homini, ut Medicina fieret etiam solitudo ipsa. — Hic nata Medicina. — Haec sola Natura placuerat esse remedia *parata vulgo, inventu facilia, ac sine impendio.*

PLIN. Nat. hist. XXIV. I.





PRAEFATIO.

Superfluum forte me suscepisse laborem, colligendo Materiam Medicam Vegetabilem Americae Septentrionalis, qui objiciant non deerunt. Dum enim, recentiori nostro aevo, in tam multiplicem varietatem creverit apparatus medicamentorum, et clarissimi nostri temporis viri omnem conferant operam, ut pharmacopolia pondere superfluatorum inutiliumque liberentur, nova ex altera parte continuo proponi laudarique, aequae saepe inertia ac futilia, plurimi, et jure quidem, conqueruntur. Ne gravius itaque illorum judicium incurram, paucis propositi et originem et rationem explicare necesse videtur. Per septem fere annos in variis Americae Septentrionalis partibus degens, quod reliqui temporis horarumque subsecivarum habebam, rei herbariae Studio destinabam. Sollicitus autem, ne omnino inutili quasi curiositate tempus contere-

)(2

rem,

rem, in proprium usum annotare coepi illas plantas americanas, quae minus adhuc cognitae quoad vires essent et usum. Idem feci, cum postea, pace restituta, Provincias Americanas australiores, Terram Marianam nempe, Virginiam et quae his adjacent Montium juga, utramque Carolinam, Floridam et Bahamenfes Insulas visitarem; sedulo ubique quaeritavi, quatenam stirpium indigenarum in medicos usus verterentur, et quaecunque sciscitanti mihi a Medicinae Practicis, Empiricis, ruricolis, immo et vetulis, indicatae vel monstratae fuere plantae, eas omnes consignavi, et quidquid de viribus illarum eruere potui, adjeci. Sic tandem factum est, ut catalogum Simplicium longum haberem, inter quae varia omnino nova, vel paucis tantum vulgata, alia autem iam magis cognita essent. Non potui non mirari divitias, quas Optima Natura Americani inhabitantibus dedit, et liberalitatem insignem, qua ad morborum sat validum exercitum profligandum, omnia, vel *maxime necessaria quidem* adjumenta, regionibus illis longe lateque extensis subministravit; simul autem dolebam, tam multa et incomparabilia medicamenta indigena et euporista, in ipsa illa America neglecta fere, vel paucioribus tantum familiaria esse incolis. Plurimi enim, Medicinam in America exercentes, ceterum eruditi et laude digni Viri, cum vel in Scholis europaeis, vel etiam in Collegiis quae in America extant,

Artis

Artis Machaoniae rudimenta posuerint, Materiam Medicam suam tamen secundum usitata (Medicorum Europaeorum) compendia edocti sunt; et sic, viam tritam prosequentes, negligunt qui per singulas suas provincias frequentari solet, domesticum simplicium apparatus, et uti ubique fere mos est, ab exteris desiderant, quibus maxime abundant. Varias huius incuriae assignari debent rationes. Displicet aliis pomposa Medicaminum farrago, et selectiori praestantiorum apparatusi sese adstringentes reliqua omnia spernunt. Alii infra Medici dignitatem esse putant, euporistas et indigenas adhibere medicinas. Tritam denique deferere viam alii nolunt, alii nesciunt, novarumque rerum periculum facere non quilibet audet; facilius enim creduntur, quae a Magistro, ut experta proponuntur, et quae cum antiquitate veritatis sigillum habere iudicantur. Cumprimis autem denominatis modo rationibus addere debemus, neglectum hucusque, inter Americanos, studium historiae naturalis, et Botanices in specie. Hujus enim perterriti difficultate, nobilissima vilis iusto pendebatur scientia, quae nunc tantum magis magisque adamari incipit. Commoda inde percipienda non equidem fugiebant Viros boni publici studiosos, qui multis abhinc annis et fervide optabant *), ut indigenarum plantarum qualitates et usus magis inquirerentur.

)(3

Ad

*) Videantur *Acta Societ. Philos. Americ. Vol. primum.*

Ad id impetrandum autem Rei herbariae notitiam inprimis necessariam esse, nemo inficias ibit, nisi qui coeco quodam modo experimenta capere velit, vel capta cum aliis communicandi, et corpora de quibus agitur rite determinandi, omnino incurius sit. Sic jamdudum inter *Medicinae Obstacula* recensuit Illustr. a LINNE', Medicorum et Pharmacopoeorum inscitiam in re botanica, ignorationem classium naturalium et Euporistorum neglectum *). Cum itaque, colligendo plantas Americae medicinales, plus fecissem quam ullus ante me, et latiore earum notitiam nactus essem, animum cepi in ipsa America, catalogum illarum occasione data publici juris faciendi; in eo etiam proposito, a plurimis Amicis Americanis, incitatus verbis et litteris fui. Ad id tamen perficiendum negotium mihi in itinere per Americam constituto, otium et opportunitas nulla fuit; dum simul destitutum me videbam necessariis adminiculis ad sistendam, quatenus liceret, absolutam Materiae Medicae Americanae historiam. Cognitum enim mihi erat, jamdudum *Observationes quasdam, de viribus et usu variarum Amer. Sept. plantarum, a BARTRAMO consignatarum* **) publici juris fecisse Illust. a LINNE'; nec latuit CLAYTONIUM, in Flora Virginica, COLDENIUM in Flora Nove.

*) Vid. Dissert. huius tituli, Amoen. acad. Vol. III.

**) Specifica Canadensis. Amoen. academic. Vol. IV. Diss. LXXII.

Noveboracensi *), KALMIVM in itinerario suo, CATESBAEVM in historia Stirpium Carolinae, et ANONYMVVM quemdam de Plantis Georgiae **), ut alios taceam, calculos suos adjecisse, quorum observata et annotata conferre, meisque addere in rem fore credidi, ut omnem, quam de viribus et usu plantarum Americanarum, e vivis et mortuis colligere liceat notitiam, simul exhiberem.

Hasce igitur pagellas, si Medicinam in America profitentibus, et civibus americanis in universum, gratas esse mihi subblandior, easdem et Medicis Europaeis utiles esse quodammodo spero. Multa certe debemus et nobilia medicamenta, occidentalibus illis regionibus, utriusque nempe Americae, quorum nonnulla adeo familiaria et trita nobis facta, ut illis forte Medicorum Europaeorum nullus carere vellet. Horum autem cognitio plura noscendi desiderium, et majores expectationes continue commovebat, ut quaecumque ex illa orbis parte afferebantur, ambabus semper manibus acciperentur. Gratum ex hac causa habebunt Medici et Scientiae Naturalis Cultores Europaei, Syllabum hunc, uno intuitu, quaecumque in vastis illis terris Septentrion. Am. hucusque innotuere medicinas exponentem. Omnes certe hae non sunt; latet

enim

(4

*) In Aëis Holmienfibus.

**) Hamburg. Magaz. Vol. XVIII.

enim adhuc partium interiorum cognitio plenaria; nec aliquarum notitiam me fugisse negabo. Licet porro haec simpliciam remotarum terrarum notitia commodum vel utilitatem medicis Europaeis absolutam spondere non videatur, calculum saltem adjecisse sufficiat ad cognitionem generalem herbarum in hominis commodum creatarum. Sed, si eas me solummodo nominare debuisse plantas, moneret Censor iniquus, quarum Viri supra laudati mentionem nullam fecere, et quas novas addidi, tunc nec uni, nec alteri parti me satisfecisse luculenter apparebit. Exigebat enim instituti ratio, ut nomina, qualitates et vires etiam illarum plantarum, quae nobis in Europa iam ad amussim cognitae sunt, denuo et verbotenus infererentur. Brevioribus autem et concisioribus, quam quae Ill. LINNAEI *Materia medica* habet verbis hoc vix fieri potuisset; eos itaque integros titulos huc transcribentem, stulti plagiarii contumelia me non assequitur. Quoniam brevitatis simul et perspicuitatis ratio habenda erat, methodum Linneanam in reliquis quoque sequi ratum habui; disjunctis ideo lineis, Nomen Specificum, Synonyma, Loca natalia, Pharmacopoeorum Nomen, Qualitates, Vires et Usus indicavi.

Quae et qualia accepi, reddo. Assertorum veritatem experiendo vel observando evincere omnino non potui. Nec negabo, esse forsitan inter plantas recensitas, aliquas quarum usus expectationi

tioni et pollicitationi minus satisfaciant; plurimas tamen dictam de se laudem effectu sustenturas esse non dubito. Ulteriore ergo hujus rei indaginem, Medicis Americanis, quibus et opportunitas datur, et Medicinae, Patriaeque commodum curae cordique esse debet, etiam atque etiam commendatam esse volumus. Absentibus interea et posteris me consulturum credidi; *enumerando* herbas quarum commendata est virtus; *efficiendo* ut quae profuisse olim jam comperta sunt, oblivioni eriperentur; *divulgando* domesticas medicinas, paratas vulgo, inventu faciles et sine impendio; *dirigendo* Americanorum attentionem in bona sua indigena; *demonstrando* tandem, quantum Medici, bene nosse plantas indigenas, intersit. Videbunt enim Americani, ex vasta hac Simplicium suorum designatione, se facile si vellent, nisi omnibus, saltem plurimis peregrinis carere posse medicinis. Tot enim et tam diversas eorum Terrae gignunt et producant plantas, pro ratione situs et soli, ut quocunque remedia ad rationalem medicinam exercendam desiderantur, paucissimis exceptis, ex proprio gremio desumi possint. Nam illarum regionum situs, ab extremo Septentrione, Austrum versus extensus, in continente Americae Septentrionalis magis, quam in ullo alio, omnia climata et omnium climatum plantas conjungit. Quae naturalis conjunctio magis adhuc proficit, inde quod Coloniae Orientem spectantes, veluti

uno sanguine natae, eadem lingua, legibus moribusque utantur, unde et mercaturarum et literarum mutuum commercium omnino facilitatur, et fructuosissimam studiorum, inventorum et notitiarum vicissitudinem sperare jubet.

Praeter plantas Americae hic enumeratas, plurimis certe, nisi omnibus indicationibus sufficientes, exotica nonnulla necessaria forte videbuntur ad omnes absolvendos numeros. Sed pauca sunt. Dabit igitur America Meridionalis vicina, et Indiae occidentis Insulae:

Chinae Corticem, Ipecacuanhae radicem,
Vanillam, Zingiberis radicem, Costum dulcem,
Piper nigrum et longum, Cinnamomum.

Ex India orientali, aliisque locis petenda:

Camphora, Caryophyllus aromaticus, Cinnamomum, Benzoë,
Copaiva, Moschata, Myrrha, Gummi ammoniacum.

Alia quaedam ex Europa, ob commercii opportunitatem, hucusque desumuntur. Sunt autem et inter haec, quae re vera Americanis necessaria pronuntientur *paucissima*, quae tempore futuro facile omnia, in ipsis Americae hortis abundanter et parvo sumtu coli poterunt, ubi varietas coeli et soli nihil excludit. Ejusmodi sunt:

Cro-

Crocus, Manna, Mastix, Oliva, Opium, Rhabbarbarum.

Sed et horum quibusdam, apta substituenda tempus indicabit forte, nisi ut certe fieri aliquando potest, aliquibus vel plurimis vacare dixerit medicus rationalis.

Extant porro in America plantae complures aliae, quae ob qualitates odoris et saporis vires medicas promittunt, etsi ut medicamenta nondum in usu sint; ex quarum numero sequentes tantum nominasse sufficiat:

Salvia urticifolia. Linn. *Horminum sylvestre odoratum.* Clayt.

Ammi lacinulis foliorum capillaribus, caule angulato.
Odore Cumini. Gr. virg. ed. n. 42.

Sium rigidius. L. *Pimpinellae species aquatica foliis odoratis.* Clayt. n. 279.

Smyrnum integerrimum, L. *Vmbellifera ignota, foliis odore grato praeditis.* Clayt.

Erythronium Dens Canis. L. *Dogs Tooth;* cuius radices lacte vel jusculo carnis coctas edunt Tataři Sagaytici; aphrodisiacas esse credebat Dioscorides; Taeniam evacuare dicuntur.

Lamium amplexicaule. L. *folio foetido.* Clayt.

Clinopodium incanum. L. *Mountain - Mint;* odorem spirans gravem, aromaticum.

Trichostema dichotomum. L. *odore grato balsamico.*

Chelone hirsuta. L. *odore foetido.* Clayt.

Arabis foliis ovatis. Gr. virg. ed. n. 99. Tota planta cochleariae sapore praedita. Clayt.

Lactuca canadensis. L. *amara, lactescens.*

Gnaphalium purpureum. L. folia odore resinoso. Clayt.
Erigeron canadense. L. Tota planta est odorifera. Clayt.
Solidaginis species, foliis linearibus; quae trita *Anisum*
spirant.

Tetragonotheca helianthoides. L. radice crassa odorata;
 Mellon - Apple - flower. Clayt.

Helianthus laevis. L. folia odore grato praedita. Clayt.

Violae variae, quarum radices forte vi purgante s. emetica
 praeditae inveniuntur, uti plures hujus generis species.

Typha latifolia. L. Ob *dulcedinem* hanc plantam pap-
 pis fetisque refertam, pauperes in deliciis habere,
 refert Clayt.

Urtica pumila. L. Planta odore grato. Clayt.

Iva frutescens. L. Cortex odore Sambuci nigrae.

Acnida cannabina. L.

Attentionem quoque merentur variae Palmarum
 Species, cultae et spontaneae.

Harum itaque ulteriorem investigationem
 Medici americani commendatam sibi habeant;
 ea tamen cura, ut quae applicant et quo suc-
 cessu, observent sollicite. Novis sic experiundo
 remediis ditescant. Est autem notatu dignum,
 earundem plantarum vires, sub calidiori frigi-
 diorique coelo crescentium, exaltari diminuive,
 ut in variis plantis americanis compertum ha-
 bemus; experimenta igitur repetita et diffitis in
 regionibus instituenda sunt, ante quam de plan-
 tae cujusdam jactatis virtutibus judicium fe-
 ratur.

Sunt

Sunt adhuc aliae, quae nostratibus (Europaeis) FORTE substitui possent, si tales desiderarentur. e. g.

Gratiola virginica. L.	Loco Gratiolae officinalis. L. m. m. 82.
Cyperus odoratus, compressus, strigosus.	— Cyperi longi, rotundi. L. m. m. 103. 104.
Lithospermum virginianum	— Lithospermi officinalis. L. m. m. 131.
Ophiorrhiza Mitreola. Gr. virg.	— Ophiorrhizae Mungos. Serpentinum rad. L. m. m. 144.
Lonicera sempervirens.	— Lonicerae Periclym. f. Caprifolii. L. m. m. 153.
Ligusticum scoticum.	— Ligustici Levistici. — 211.
Parnassia noveboracensis.	— Parnass. palustr. f. Hepaticae albae. L. m. m. 240.
Lilium superbum, canadense	— Lilii candidi, f. lilii albi. L. m. m. 250.
Saxifraga pensylvanica.	— Saxifragae granulatae f. albae. L. m. m. 318.
Lythrum verticillatum.	— Lythri Salicariae. — 329.
Aquilegia canadensis.	— Aquilegiae vulgaris. L. m. m. 384.
Anemone quinquefolia.	— Anem. nemor. f. Ranunculi albi. L. m. m. 390.
Clematis virginiana.	— Clematid. rectae, f. Flammulae Iovis. L. m. m. 591.
Pedicularis canadensis.	— Pedicul. palustr. f. aquaticae. L. m. m. 431.

Galega virginica.	Loco Galegae officinalis. <i>L. m.</i> <i>m.</i> 483.
Hypericum canadense.	— Hyperici perforati. <i>L. m.</i> <i>m.</i> 492.
Tragopogon virginicum.	— Tragopogi pratensis. <i>L. m.</i> <i>m.</i> 493.
Gnaphalium plantaginifol.	— Gnaphalii dioici. <i>L. m. m.</i> 517.
Doronicum. <i>Gr. virg.</i> 126.	— Doronici pardalianch. <i>L.</i> <i>m. m.</i> 524.
Orchis ciliaris.	— Orchid. bifoliae et Morionis, vel Satyrii et Salep radicum. <i>L. m. m.</i> 543. 544.
Menispermum canadense.	— Menispermi Cocculi. (indici) <i>L. m. m.</i> 603?
Cissampelos smilacina.	— Cissamp. Pareirae (bravae) <i>L. m. m.</i> 607.
Andropogon aliquod.	— Andr. Schoenanthi f. Nardi. <i>L. m. m.</i> 612. 613.
Polypodium virginianum.	— Polypodii vulgaris. <i>L. m. m.</i> 631.
Lycopodium rupestre.	— Lycopodii (musci) clavati. <i>L. m. m.</i> 634.

Bahamenses Insulae, strictiori sensu ad Americam quidem septentrionalem non pertinent; attamen cum varia et praestantiora quaedam suppeditent Medicamina, haec ut infererentur non abs re fore credidi; id enim excusabit vicinitas, et facile et constans inter illas partes commercium, deinde climatum, et naturalium commodorum, similitudo, quam

quam australiores Floridae partes cum illis insulis habent. Protenditur enim Floridae peninsula ad 25 Grad. latitudinis, et plurimae Insulae Bahamenses sub eadem, et altiori adhuc, latitudine jacent. Observandum quoque, quod Continens Americae Septentrionalis, secundum divisionem geographicam, includat etiam Isthmum illum Sinum Mexicanum inter et Mare pacificum, Provinciam nempe Mexicanam et alias; ut itaque, si sensu latiori rem sumere placuisset, multo plures, quas Zona torrida alit, plantas, catalogo nostro inferi potuissent. Sed nimiam evitandi studens prolixitatem, me illis tantum adstrinxi regionibus, quas ipse quoad majorem partem permigravi.

Nomina plantarum vulgaria anglicana omni cura collegi, ut iis etiam proficius sim, qui botanica abhorrent; ast tam varia sunt in diversis partibus, et vacillantia, ut diversis plantis saepe adponantur nomina eadem, iisdemque saepe diversissima. Plantas nonnullas obscuras, et quarum nomina trivialia tantum accepi, omni studio extricare annifus sum, ut nomen systematicum pro certiori indagine habeatur; et hoc in labore maxime adstitit Ill. SCHREBERVS, cuius, pro summa qua in me semper usus est, quamve gratus semper venerabar, benevolentia, debitam mentionem facio.

Ex recensitis medicinis, quasdam casus detexit, dira necessitas alias, alias iterum Europaei Americam adeuntes ex analogia in usum vertebant. Plures tamen et praestantiores quaedam, *Indigenis Americes* debentur, qui vel sponte, vel amicitia pretiove allekti, colonis Europaeis easdem indicarunt. Multo plura autem et eximia adhuc ad varios morbos *specificis* iisdem *Indigenis Americanis* nota et familiaria esse, (quorum revelationem autem omni studio evitare dicuntur) in America ubique fere creditur. Nescio tamen quonam jure. Paucissima enim, si ulla, ex illorum remediis, specificorum nomine honorari merentur; particularibus enim indicationibus respondent; sic e. g. Antisyphilitica illorum, maximam partem, diuretica, sudorifera, vel drastica sunt. Medicinam plane empiricam exercent, nunc omnino optatissimo et mirando effectu, nunc summe contrario, cujus autem varias et obvias rationes, ex consideratione constitutionis, consuetudinum, vitae et dietae generis et dosium magnarum facile patent, id quod ulterius dilucidandi hic locus non est. In universum autem, medendo variis morbis illos feliciores nobis esse, sustinere nemo potest, licet nonnulli id persuasum sibi habeant. Contra Crotali s. Caudisonae Morsum tot et qualitatibus suis adeo dissimiles commendantur herbae, ut plurimarum certe fidem et efficaciam suspectam habere debeamus, idque

eo magis, cum experientia satis evictum sit, letalitatem vel malignitatem talium vulnerum nimium variare secundum regionum, anni temporum, partium vulneratarum aliarumque multarum causarum diversitatem, ita ut nil mali eveniat interdum, etiam omni neglecta medicina; ex altera parte autem negari non potest, easdem plantas, qualitates medicas omnino spondere utiles et investigatione ulteriore dignas; ideoque nullam omittere volui.

Loca plantarum natalia certiora tantum adposui, majorem illarum tamen numerum, vel omnes vel plurimae saltem Provinciae, communem habent; ubi unica igitur tantum indicata est provincia, eandem plantam in aliis quoque provenire ideo non negatur; quas vero in provinciis disjunctis, e. g. Canada — Virginia, vel Pensylvania — Carolina habitare dixi plantas, easdem in omnibus quoque interjacentibus provinciis provenire, facile intelligitur.

Quae appendicis loco dantur nomenclaturae, simplicia sistant ex regno animali et minerali Americano petenda, tam obsoleta quam usitata et in materiis medicis vulgo recensita. Videant Americani, et in his sibi fere sufficientem esse Patriam, licet horum regnorum divi-

tiae,

))((

tiae, mineralis praesertim, parum hucusque investigatae sint.

Dabam Baruthi die XXVI. Septembr.
CLD. ID CCLXXXVI.





CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compressis, emarginato bifidis. *Linn. Spec. pl. 5. mat. med. 1. virginica.* — *Kelp. Glas-schmalz.*

S. caulium ramorumque articulis apice bicor-nibus. *Gron. Fl. virg. 129. id. alt. 1.*

Loc. Americae littora maritima. *Annua.*

PHARM. *Salicornia* Herba; Soda. \ominus


QUAL. falsa; (hinc a pecoribus expetita.)

Culinaris, Rarior.

VIS? antiscorbutica, appetitum excitans. (Sal corrosivum.)

VSUS: Scabies, Abscessus, Scelotyrbe, Hyper-farcosis.

COMP. Sapo venetus, Sal Seignette, Fel vitri.



CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

2. LIGVSTRUM *vulgare*. Linn. Sp. pl. 10.
Mill. Dict. — Privy. Reinweide.

LOC. Noveboraci et Insulae longae colles, fructu-
teta. Frutex, vulgaris.

PHARM. Ligustri Folia, Baccae.

QUAL. amariuscula, ingrata.

VIS: subadstringens.

VSUS: Angina, Labarium, Odontalgia, aliique
oris et faucium morbi.

COMP. Gargarismata.

Pigmentum purpureum vel nigrum, diversa
praeparatione praebent baccae.

3. OLEA *europaea* foliis lanceolatis. Linn. Sp.
pl. 11. mat. med. 79. Mill. Dict. — Olive-
tree. Oelbaum.

LOC. Georgia, Carolina. Arbor, cicur.

PHARM. Olivae, (fructus) conditae. (O).

QUAL. (O) pingue - blandum, insipidum, ino-
dorum; Conditae, austerae.

VIS: (O) obtundens, emolliens. Condit. toni-
ca, stomachica.

VSUS: Venena, Colica, Dysenteria, Rheuma-
tismus, Tenesmus, Tussis, Morsus Canis ra-
bidi.

4. SY-

3. Americana oleum vix praebet. Europaea autem facile crescit
in provinciis australioribus, hyemesque bene fert intacta;
de oleo exprimendo nulla adhuc experimenta facta, Hamb.
Mag. XVII. 489.

4. SYRINGA *vulgaris*, foliis ovato - cordatis.
Linn. Sp. pl. p. 11. Mill. Dict. — Lilac,
Pipe - tree, Queüe de Renard.

In hortis colitur, cicur.

Ex ligno, cum aqua destillato, obtinetur ☉ butyraceum, odore oleo Ligni Rhodii vel Santali flavi simili; infusum aquosum flavescens, odore grato balsamico; Tincture spirituosae amaricans, evaporatione extractum Sanguini Draconis simile sistit.

5. CIRCAEA *lutetiana*, caule erecto, racemis pluribus. *Linn. Sp. pl. 12.*

Circaea canadensis latifolia, flore albo. ibid. Gr. virg. ed. n. p. 2.

Loc. Canadae, Noveboraci nemora, fruteta umbrosa. *Biennis.*

Radices colore flavo tingunt. Folia, in cataplasmatibus forma, ad Condylomata haemorrhoidal. externe, et infusum interne laudantur; (uti *Circ. alpina.*)

6. VERONICA *virginica*, spicis terminalibus, foliis quaternis quinisve. *Sp. pl. 13. Amoen. acad. 4. p. 519. 521. Gr. virg. 4. ed. n. p. 2. Cold. noveb. 3. Mill. Dict. — Indian Physic, Physic - root, five leaved Wort, Indian Queatel.*

Loc. Pascua aprica. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. *Veron. virg. Radix. Decoct. rad. Manip. j. in lactis Libr. sem.*

QUAL. amara.

VIS: purgans! emetica.

COMP.

4. DIANDRIA. MONOGYNIA.

VERONICA *officinalis*, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Linn. Sp. pl.* 14. *Mat. med.* 80.

Plantam huic simillimam in pascuis aridis, circa Libanon Pennsylvaniae, vidi. —

vis: Veron. officin. adstringens, vulneraria, tonica.

vsus: Cachexia.

7. VERONICA *Beccabunga*, racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Linn. Sp. pl.* 16. *Mat. med.* 81.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus laxè spicatis ex alis. *Gr. virg. p. 4. ed. nov. p. 2. Mill. dict.*

Loc. Noveboraci, Virginiae scaturigines.

Perennis, frequens.

PHARM. *Beccabungae* Herba, Conserva, Aqua.

QUAL. subinsipida, inodora, oleracea.

Rarior, superflua.

vis: diuretica, discutiens?

vsus: Scorbutus, Obstructiones Viscerum.

8. VERBENA *urticifolia*, tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis indivisis ovatis serratis acutis petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 29. *Mill. Dict.*

Verbena foliis ovatis, caule erecto, spicis filiformibus paniculatis. *Gr. virg. 7. ed. nov. p. 4.*

Loc. Canadae, Noveboraci, Virginiae arida.

Biennis, cicur.

PHARM. *Verbenae* Herba, Radix.

QUAL. Rad. amaro - adstringens. Herba insipida, inodora.

vsus:

vsus: Radix, simul cum cortice interiore Quercus albae, lacte et aqua decocta, felici successu ad Erysipelas venenosum a Toxicodendro causatum adhibebatur in Castris Americanorum. Praestabat saepe, post Aqu. vegeto-mineral. frustra adhibitam.

Herba sub nomine *Purvain*, incolis Marilandiae in usu est.

9. LYCOPVS *virginicus*, foliis aequaliter ferratis. *Linn. Sp. pl.* 30. *Gr. virg.* 8. *ed. n.* p. 5. *Mill. Dict.*

Loc. Noveboraci, Virginiae, campi aridi, sylvatici.

QUAL. Semina nitentia odorem balsamicum terbinthinatum spirant; folia odore debiliora, cum Vitriolo Martis colorem nigrum praebent.

10. CVNILA *mariana*, foliis ovatis ferratis, corymbis terminalibus dichotomis. *Linn. Sp. pl.* 30. *Satureja origanoides. Sp. pl.* 1. 568. — *Wild Basil; Dittany.*

Thymus foliis ovatis acuminatis ferratis, corymbis lateralibus terminalibusque pedunculatis. *Gr. virg.* 64. *Ed. n.* 88.

Loc. Pennsylvaniae, Marylandiae, Virginiae sicca. *Biennis.*

A 3

PHARM.

10. *Caulis* acute quadrangulus, ramosus. *Folia* subsessilia, ovata, acuta, ferrata. *Corymbi* terminales et axillares dichotomi, *pedicellis* capillaribus, *bracteolis* linearibus. *Cal.* cylindr. 5-fidus, *lacinjiis* brevibus aequalibus acutis; 10-striatus, pilis nitentibus. *Os calycis* villosum. *Semina* quatuor.

PHARM. *Cunilae marianae* Herba.

QUAL. fragrans, spirans, odore *Ocimum* referens.

VIS: excitans, nervina.

VSVS: Febres intermittentes; Cephalalgia; succus expressus cum lacte ad morsuram serpentum.

11. *CVNILA pulegioides*, foliis oblongis unidentatis, floribus verticillatis. *Linn. Sp. pl.* 30. *Melissa pulegioides. Sp. pl.* 1.593. — *Pennyroyal.*

Melissa floribus verticillatis glomeratis secundum longitudinem caulis, foliis tomentosis. *Gr. virg.* 167. *Ed. nov.* p. 90. *Cold. noveb.* 143. *Kalm. it.* 2. p. 314.

LOC. Canadae, Noveboraci, Virginiae sicca. *Annua, vulgaris.*

PHARM. *Cunilae pulegioidis* Herba.

QUAL. spirans.

VIS: pellens, carminativa, resolvens, pectoralis, antispasmodica, diaphoretica.

VSVS: Palpitatio! Febres, Arthritis.

COMP. Infusum, Cataplasma.

12. *MONARDA fistulosa*, capitulis terminalibus, caule obtusangulo. *Linn. Sp. pl.* 32. *Am. acad.* 4. p. 533. *Mill. dict. t.* 122. f. 2. *Corn. canad.* 13. t. 14. *L. mat. med.* 84.

Monarda mollis. Linn. Amoen. acad. 3. p. 399.

LOC. Canada. *Perennis, cicur.*

QUAL. spirans, amara.

VIS:

VIS: resolvens, nervina, tonica.

VSVS: Febres intermittentes.

13. **MONARDA** *didyma* floribus capitatis subdynamis, caule acutangulo. *Linn. Sp. pl.* 32. *Mill. ic.* 122. f. 1. *Cold. noveb.* 7. — *Oswego the.*

LOC. Nova Anglia, Noveboracum, Pensylvania. *Perennis.*

QVAL. Folia contrita spirant odorem gratum, reficientem.

VSVS: Febres intermittentes Infusum foliorum.

14. **SALVIA** *officinalis*, foliis lanceolato - ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Linn. Sp. pl.* 34. *Mat. med.* 86. — *Sage.*

Salvia major, et minor aurita et non aurita. *Bauh. pin.* 237.

LOC. Colitur in hortis. *Perennis, cicur.*

PHARM *Salviae* Herba, ∇ , \sqcup , $\circ\circ$, Fl. Sem. **QVAL.** spirans, amaricans.

VIS: tonica, nervina, stomachica, uterina.

VSVS: Languor post febres, Galactorrhoea post ablactationem, Aphthae, Relaxatio Gingivarum, Cibi.

15. **COLLINSONIA** *canadensis*. *Linn. Sp. pl.* 39. *Amoen. acad.* 4. p 514. *Mat. med.* 89. *Cold. noveb.* 8. *Kalm. it.* 2. p. 317. — *Horjeweet.*

Collinsonia floribus pallide luteis: foliis ovato - oblongis acute ferratis. *Gr. virg. ed.* n. p. 6.


LOC. Canada, — Virginia; nemorosa. *Perennis.*

PHARM. *Collinsoniae* Radix; Flores.

QUAL. Rad. nidorosa: florum odor gratissimus, vehemens.

VIS:

VSVS: Colica lochialis; Morfura serpentum; Vulnera; Febres (Dumb fever). In doloribus rheumaticis, artus foliis fricandi. Vulnera Equorum (Gall'd Backs.)





CLASSIS. III.

TRIANDRIA.
MONOGYNIA.

16. VALERIANA *Locusta*, radiata, floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *L. Sp. pl.* 47. *E. Mill. dict.* — Corn Sallad. *Rapünzchen*.

LOC. Marilandiae, Virginiae arva. *Annua*.

Folia in acetariis hiberno tempore adhibentur.

Succus prodest contra calculum renum. Hypochondriacorum summum est solatium. *Boerb.*

17. IRIS *versicolor*, corollis imberbibus, germi-
nibus subtrigonis, caule tereti flexuoso, fo-
liis ensiformibus. *L. Sp. pl.* 57. *Amoen.* 4.
p. 533. *Mill. dict. nr.* 18. *Cold. noveb.*

LOC. Virginiae, Marylandiae, Pennsylvaniae,
Noveb. Rhodisl. prata humida. *Biennis*.

PHARM.

QUAL. Radix mucilaginoso, dulcescens, acris.

Flores odore debili, grato.

VIS: purgans, unde syphilitica creditur.

VSVS: Mirifice valet in ulceribus tibialibus et
vulneribus. *Kalm.*

18. IRIS *virginica*, corollis imberbibus, germi-
nibus trigonis, caule ancipiti. *L. Sp. pl.* 58.
Iris aquatica Majo florens angustifolia, flore ex
pallide caeruleo et nigro variegato, radice
reptatrice. *Gron. virg.* 2. *ed.* n. 7.

A 5

Loc.

10 TRIANDRIA. MONOGYNIA:

Loc. Virginiae humida, uliginosa. *Biennis.*
Vi cathartica insigniter pollet. *Clayt.*

19. IRIS *verna*, corollis imberbibus, caule unifloro foliis brevioribus, radice fibrosa. *L. Sp. pl.* 58. *Mill. dict. n.* 17.

Chamae iris repens verna, flore ex violaceo et aureo variegato, odorato, cuius etiam datur Varietas flore albo. *Gr. virg. 10. ed. n.* 7.

Loc. Virginia. *Biennis.*

Florum Syrupus viribus cum Violarum Syrupo convenit. *Clayt.*

20. COMMELINA *communis*, corollis inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule repente glabro. *Linn. Sp. pl.* 60. *Gron. virg. 130. ed. n. p.* 8. *Mill. dict. n.* 1. — *Common - Day - flower.*

Loc. Virginia et Provinciae meridionales; palustribus gaudet. *Annua.*

vsus: florum apud Iaponenses pro Ultramari-
no conficiendo. Petala cum furfure Oryzae mixta humectantur et massa paullo post exprimitur. Expresso succo immergitur charta pura et humectata siccatur, vicibus toties iteratis, donec ipsa charta pro colore valeat. *Thunberg flora Iaponica. p.* 35. *Koo - Seki. Kacmpf. Iapon. t.* 889.

21. XYRIS *indica*. *Linn. Sp. pl.* 62. *Gron. virg. 11. ed. nov.* 8.

Loc. In pascuis madidis.

vsus: Succus contusae plantae ad Impetiginem curandam laudatur a Pisone. *Iupicai. Pison. brasil. 238.*

DIGYNIA.

22. SACCHARVM *officinarum*, floribus paniculatis. *Linn. Sp. pl.* 79. *Mat. med.* 105. *Mill. Diët.*

LOC. Florida, Mississippi. *Perennis, cicur.*

PHARM. Saccharum Canariense cet.

QUAL. dulcissima, inodora, mitissima.

Culinaris, usitatissima.

VIS: edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria.

VSVS: Raucedo, Tussis, Pannus.

COMP. Omnes Confectiones, Condita, Conserve, Syrupi.

23. AVENA *fativa* paniculata, calycibus dispermis, feminibus laevibus. *Linn. Sp. pl.* 118. *Mat. med.* 108.

LOC. *Annua, cerealis, frequens.*

PHARM. *Avena* excorticata.

QUAL. farinacea, insipida. *Usitatissima.*

VIS: refrigerans magis, quam Hordeum.

VSVS: Febres.

24. HORDEVUM *distichum* flosculis lateralibus masculis muticis; angularibus imbricatis. *Linn. Sp. pl.* 125. *Mat. med.* 109.

LOC. *Annuum, cereale, vulgare.*

PHARM. *Hordeum* mundatum, excorticatum, perlatum. Acetum vulgare. Spiritus. Cerevisia antiqua.

QUAL. insipida, farinacea. *Culinaris.*

VIS: nutriens, refrigerans. Aceti resolvens, refrigerantissima.

VSVS:

vsvs: †ti Inflammatio; Cerevisia Contusura.
 comp. Lohoc hordeatum. Syrupus acetosus,

25. TRITICVM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricosus laevibus imbricatis submuticis.

Linn. Sp. pl. 126. Mat. med. 110.

LOC. *Annuum, cereale, frequentissimum.*

PHARM. *Trititi* Amylum, Pulvis Cyprius.

QVAL. farinacea, insipida.

VIS: acescens, mucilaginosus.

vsvs: externus.

26. TRITICVM *repens* radice repente, foliis planis. *Linn. Sp. pl. 126. Mat. med. 111.*

LOC in cultis. *Perenne.*

PHARM. *Graminis* Radix.

QVAL. farinacea, dulcescens, inodora. *Vsitata.*

VIS: nutriendus, aperiens, diuretica, mundificans, anthelminthica.

vsvs: Obstructio Viscerum.





CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

27. GALIVM *tinctorium*, foliis linearibus: caulibus senis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunculis subbifloris, fructibus glabris.
Linn. Sp. pl. 153.

LOCVS: Noveboracum, Pensylv. etc. *Perenne*.
QVAL. Lac coagulat. Colore rubro tingit.
Kalm.

VSVS: Morbi cutanei.

28. CALLICARPA *americana*. *L. Sp. pl.* 161.
Johnsonia. Mill. Dict.

Frutex foliis amplis subrotundis acuminatis ex adverso binis, viminibus lentis infirmis cet.

Gr. virg. 138. *ed. n. p.* 19.

Frutex baccifer verticillatus cet. *Catesby. Carol.* 2. *p.* 47. *t.* 47. — *Sowerbush.*

LOC. Virginia, Carolina.

Frutex.

PHARM. *Callicarpae* Folia.

QVAL. Baccae acescentes.

VIS:

VSVS: Foliis ad Hydropem felici successu utebatur *Dr. Dale. Miller.* Baccae violaceo-purpureae, contusae et cum alumine coctae, lanam purpureo tingunt.

29. PLANTAGO *major*, foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Linn. Sp. pl.* 163. *Mat. med.* 119. *Gr. virg. ed. n. p.* 19. — *Plantain.*

Loc.

LOC. Noveborac. Virgin. sicca. *Perennis, vulgaris.*
 PHARM. *Plantaginis latifoliae* Radix, Herba, Aqua,
 Semina.

QVAL. insipida, herbacea, substyptica.

VIS: adstringens, vulneraria; Sem. anthelmin-
 tica.

VSVS: Tabes, Ulcera, Diarrhoea. Sem. Dy-
 senteria.

COMP. Gargarismata.

30. CORNVS *florida*, arborea, involucro ma-
 ximo: foliolis obcordatis. *Linn. Sp. pl.* 171.
Gr. virg. 17. *ed. n.* p. 20. *Cold. nov.* 16 *Kalm.*
it. 2. p. 321 *et* 3. p. 104. *Mill. Dict.* — *Dogwood.*

Cornus Mas *virg. Cat. car. I.* p. 27. t. 27.

LOC. Nova Anglia — Carolina. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. *Corni floridae* Cortex (radicis); Gemmae.

QVAL. amara.

VIS: adstringens. Gemmar. carminativa.

VSVS: Febres intermittentes. Ligni usus me-
 chanicus.

Decoct. Corni, a decocto Corticis peruviani
 gustu vix discernendum; Intermittentes ae-
 que certo curat ac Cort. peruv. — Vires
 addita Serp. Virg. acuuntur. — Rad. Sas-
 safr. et Cort. Corni $\frac{aa}{3vj}$. Coqu. cum Aquae
 libris viij, ad remanentiam $\frac{1}{2}j$, ad Ulcera
 cancrofa, maligna tepide et frequenter ap-
 plicata, prodest.

31. CORNVS *Amomum*, arborea, foliis ovatis
 petiolatis, floribus corymbosis terminalibus.

Mill. dict. Gr. virg. ed. n. 20. *Cold. noveb.*

17. — *Swamp - Dogwood.*

LOC. Americae borealis dumeta.

Frutex.

QVAL.

QVAL. Baccarum parenchyma viride amaro - adstringens.

VSVS: folia Indigenae Tabaco admiscant. Ligni uf. mechan.

32. PTELEA *trifoliata*, foliis ternatis. *Linn. Sp. pl.* 174. *Mill. dict.* 211. *Gr. virg. ed.* n. 20. *Cat. carol.* 2. t. 83.

LOC. Canada - Carolina.

PHARM. *Pteleae* folia.

QVAL. fol. contrita odorem spirant ingratum.

VIS: anthelminthica, vulneraria.

VSVS: Vermes.

COMP. Folior. infusum, interne et externe in usu est apud Canadenses.

33. DORSTENIA *Contrajerva* acaulis, foliis pinnatifido palmatis ferratis, floribus quadrangulis. *Linn. Sp. pl.* 176. *Mat. med.* 124. *Mill. Dict.*

LOC. Mexico.

Perennis.

PHARM. *Contrayervae* Radix.

QVAL. aromatica, subfragrans, amaricans.

Vsitata, praestans.

VIS: adstringens, stomachica, alexiteria, sudorifera.

VSVS: Febres, Exanthemata, Dysenteria.

COMP. Pulv. Comitissae.

DIGYNIA.

34. HAMAMELIS *virginiana*. *Linn. Sp. pl.* 186. *Amoen. acad.* 4. p. 533. *Gr. virg.* 139. *ed. n.* p. 24. *Cat. Carol.* 3. p. 2. t. 2. *Cold. noveb.* 18. — *Witch - Hazel.*

LOC.

LOC. Noveboracum — Carolina. *Arbor.*

QUAL. Semina nigra nitentia, farinaceo - oleo-
fa, uti Coryli, edulia; unde Pistachia virgin.
Plukenet. vocata.

VSVS:

35. CVSCVTA *americana*, floribus (vix) pedun-
culatis. *Linn. Sp. pl.* 184. *Mat. med.* 128.
Gron. virg. 18. *ed. nov.* 22.

LOCVS: Novanglia — Virg. sepes, arbores,
frutices obvolvens. *Annua, vulgaris.*

PHARM. *Cuscutae* Herba.

QUAL. amaricans, inodora, subadstringens.

Dubia.

vis: laxans, stomachica.

VSVS: Febres intermittentes.

TETRAGYNIA.

36. ILEX *Aquifolium*, foliis ovatis acutis spino-
sis. *L. Sp. pl.* 181. *Gr. virg.* 12. *ed. nov.* 22.
Mill. dict. — Holly-tre. *Houx, Housson.*
Gallis.

LOC. Novebor. — Virginia. *Arbor.*

PHARM. *Aquifolii*, Radix, Cortex, Folia, Bac-
cae. (Viscum.)

QUAL. mucilaginosaf, amara.

vis: resolvens, pectoralis, laxans. Bacc.

VSVS: Tumores maturantur Cataplasmate ex
Baccis decoctis. Baccarum succus expressus
ad Icterus laudatur; Baccae decoctae ad
Colicam; Baccae Nro. 10-12. alvum sol-
vunt; Foliorum pulvis et Decoctum, vel
per

per se, vel cum baccis, ad tussim et pleuriticos dolores commendantur.

37. ILEX *Cassine*, foliis ovato lanceolatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 181. *Mat. med.* 130. *Mill. Dict.*

Aquifolium Carolinense, foliis dentatis, baccis rubris. *Cat. carol. I. p.* 31. *t.* 31.

LOC. Carolinae, Virginiae, maritima, arenosa. *Arbor, vulgaris.*

PHARM. *Cassines* Folia. (leniter ustulata.)


QUAL. subaromatica, inodora. *Irita, Culinaris.*

VSUS: Variola! Diabete! Febres omnes.

Arbor non spinosa floribus parvis monopet. quadrifidis, cortice glabro albicante, baccis rubris tetrapyrenis, *sapore fervidis*, foliis deciduis. *Clayt. nr.* 340 et 656. *Gr. virg. ed. n.* 22.

Cassine vera floridanorum arbuscula baccifera, alaterni fere facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene. *Cat. carol. II.* 57. *t.* 57. — An hujus tantum Varietates?

Ilex canadensis ab Aquifolio differre dicitur, foliis brevioribus spinis robustioribus. Viscum ex Cortice coquitur. Lignum ad novacula exacuandas.



CLASSIS II.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

38. ANCHUSA *virginiana*, floribus sparsis, caule glabro. *Linn. Sp. pl.* 191.

Anchusa lutea minor, quam alii *Puccoon* vocant. *Gr. virg.* 19. *ed. n.* 24.

Pro Pigmento infervit Indigenis Americae. Forte reliquis etiam Buglossi et Alcanthae viribus praedita.

39. CYNOGLOSSUM *virginianum*, foliis amplexicaulibus ovatis. *Linn. Sp. pl.* 193. *Gr. virg.* 19. *ed. nov.* 24. — *Houndstongue* *).

LOC. Virginia.

PHARM. *Cynoglossi* Radix.

QUAL. foliorum fumus, uti Tabaci, intoxicans.

VIS: vulneraria, styptica.

VSVS: Diarrhoeam, Dysenteriam, omnemque alvi fluxum sistit radix. *Clayt.*

40. PULMONARIA *virginica*, calycibus abbreviatis, foliis lanceolatis obtusiusculis. *L. Sp. pl.* 194. *Mill. dict. t.* 212. *Gr. virg.* 20. *ed. n.* 25. — *Mountain - Cowslip.*

LOC. Virginia etc.

VIRES:

*) *Houndstongue* - sub hoc nomine et alia planta, foliis radicalibus oblongo-ovatis, acutis, glabris, monstrata mihi fuit in Marylandia. Flores non vidi - Ad tumores, ulcera Mammarum etc. laudatur et adhibetur -- Sed *Cynoglossi* faciem vix habebat.

VIREs: Radix crassa, vulneraria cum Symphyto viribus convenit. *Clayt. n. 339.*

41. SYMPHYTUM *officinale* foliis ovato lanceolatis decurrentibus. *L. Sp. pl. 195. Mat. med. 136.*

LOC. In Noveboraci, Insulae longae etc. cultis passim hospitur.

PHARM. *Consolidae majoris* Radix, Conserva, Herba, Flores.

QUAL. mucilaginosa. *Vsitata.* Hba, Fl. *superflua.*
VIS: inviscans, glutinans, vulneraria, adstringens.

VSUS: Dysenteria, Haematuria, Haemoptysis! Stranguria.

COMP. Syrupus, Empl. —

42. HYDROPHYLLUM *canadense*, foliis lobato-angulatis. *Linn. Sp. pl. 209. — Scally-root.*

LOC. Canada; et Pennsylvaniae sylvestria, montosa, humida. — *Biennis.*

PHARM. *Hydrophylli* Radix. --

QUAL.

VIS:

VSUS: Decoct. Herbae et radicis, ad serpentum Morsuras; Toxicodendri Erysipelas.

42. *Rad.* crassa, horizontalis, ramosa, testa squamis crassis, obtusis, imbricatis. *Folia* radicalia, petiolo longo, semitereti, tenuiter piloso; sub-5-loba, lobis acutis, densatis, pilis tenuibus rarisque instructa. *Folia* caulina ejusdem sunt structurae, sed majora. *Caulis* semiteres, uti petioli. *Flores* in panicula racemosa coarctata terminali. *Cul.* 5-partitus: lacinis lanceolato linearibus, subulatis, glabris, erectis. *Capf.* globosa, bivalvis, semine unico globulari.

43. *LYSIMACHIA quadrifolia*, foliis quaternis subsessilibus, pedunculis quaternis unifloris. *Linn. Sp. pl.* 211. *Gr. virg.* 20. *ed. n.* 26. — *Peters-wort.*

LOC. Noveboracum — Virginia.

PHARM. *Lyfimachiae* Radix et Herba.

VIS: subadstringens.

VSVS: Decoct. ad Febres intermittentes.

44. *ANAGALLIS arvensis*, foliis ovatis, caule procumbente. *Linn. Sp. pl.* p. 58. *Mat. med.* 142.

LOC. Noveboraci arva, culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. *Anagallidis* Herba, ∇, ⊙, ⊔, Syr. Essentia.

QUAL. acris, inodora.

Rarior.

VIS:

VSVS: Melancholia, Hydrophobia. *Boerb.*

Decoctum huius plantae, in sudore sanguineo Vitulorum „The bloody Murrain,, dicto, utile et efficax esse mihi narratum est. *Cold. noveb. nr.* 158.

Alexipharmaca est et pulmonica; moderate calida et sicca: ad febrium deliria compefcenda commendatur. *Clayt. n.* 401.

45. *SPIGELIA Marylandica*, caule tetragono, foliis omnibus oppositis. *Linn. mant.* 338.

Lonicera spicis terminalibus, foliis ovato-oblongis acuminatis distinctis sessilibus. *Gron. virg. ed. n.* 30. *Linn. Sp. pl.* 249. *Anoen. acad.* 4. p. 523. — *Indian Pink.*

LOC. Marylandia, Virginia, Carolina. *Perennis.*

PHARM.

43. *Numularia aquatica* Beccabungae foliis. *Gr. virg. ad n.* 26. An *Lyfim*, *Numularia* L.? - L. *Mat. med.*

PHARM. *Spigeliae marylandicae* Herba.

QVAL.

VIS: narcotica, anthelminthica!

VSVS: Lumbrici, Convulsiones.

46. CONVOLVULVS *panduratus*, foliis cordatis integris panduriformibusque, calycibus laevibus. *L. Sp. pl.* 219. *Gr. virg. ed. n.* 28.?

Ad hanc speciem referendus est vel saltim proxime accedit Convolvulus, copiose circa Bethlehem Pensilvaniae proveniens, cuius Radix colligitur et pro *Mechoacanna* venditur. Radicis habitus, et Vis, Mechoacannae.

47. CONVOLVULVS *Ialappa*, foliis difformibus: cordatis, angulatis, oblongis, lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Linn. mant.* 43. *Mat. med.* 148.

LOC. Mexico.

Perennis.

QVAL. nauseosa, acris.

VIS: purgans.

VSVS: frequens.

COMP.

Reliquae quoque Convolvuli species:

carolinus *L. Sp. pl.* 219.

purpureus *) etc. vires medicas promittunt.

CONVOLVULVS *Batatas*, foliis cordatis hastatis quinque-nerviis, caule repente hispido tuberifero. *Linn. Sp. pl.* 220. *Gr. virg. ed. nov.* 28. *Mill. Dict.* *Catesb. Carol. t.* 60. p. 60.

LOC. Pensylv. — Carolina. Colitur.

B 3

CON-

*) Purple Bindweed. *Cat. carol. l.* 35. Succo huius, manus suos illinebat Indigena Americanus, et Crotalum horridum impune manibus tractabat.

CONVOLVUS *brasiliensis*, L. Sp. pl. 226. . ?
 foliis subrotundis, emarginatis, crassis etc.
 Loc. Insulae Bahamenses in arena ad mare.
 E foliis potio antifebrilis paratur.

COFFEA *arabica* -- Insulae bahamenses, et
 reliquae Indiae occidentalis.

48. SAMOLVS *Valerandi*. Linn. Sp. pl. 243. Gr.
 virg. 23. ed. nov. 30.

Loc. Ad littora, fontes Noveboracenses. —
 Florida.

QUAL. amaricans.

VIS: Veronicæ Beccabungæ analoga?

Incolae Minoræ eâ vario modo utuntur. Cleg-
 born.

49. LONICERA *Symphoricarpos* capitulis late-
 ralibus pedunculatis, foliis petiolatis. Linn.
 Sp. pl. 249. Mat. med. 154. Gr. virg. 23. ed.
 nov. 30.

Loc. Virginia — Carolina. Frutex.

PHARM. *Symphoricarpi* Stipites.

QUAL. styptica. Inusitata.

VIS: subadstringens.

VSVS: Febres intermittentes.

Radici pulvis dosi mediocri exhibitus, adver-
 sus omnes febres intermittentes, tutum cer-
 tum et minime fallax remedium. Clayton.

50. LONICERA *Diervilla*, racemis terminalibus,
 foliis ferratis. Linn. Sp. pl. 249, Mat. med.
 155. Amoen. acad. 4. p. 532.

Loc. Canada. Frutex.

PHARM.

PHARM. *Diervillae* Stipites.

QUAL. nauseosa.

VIS: pellens.

VSVS: Dysuria; Gonorrhœa; Syphilis.

MIRABILIS *Ialappa*. Linn. Sp. pl. 252. Mat.
med. ed. 1. p. 76. Cold. noveb. 29.

51. TRIOSTEVM *perfoliatum* floribus verticillatis sessilibus. Linn. Sp. pl. 250. Amoen. acad. 4. p. 516. Gr. virg. ed. n. 31. Cold. noveb. 244. — Dr. Tinkers Weed; Bastard - f. false *Ipecacuanha*; White Gentian; Sweet - Bitter. Fever root et Cinque.

LOC. Noveboraci — Virginiae, umbrosa.

Perennis.

PHARM. *Triostei* Radix.

QUAL. amara. Odor pl. nauseosus; sapor herbaceus.

VIS: emetica.

VSVS: Febres intermittentes, Pleuritis.

52. TRIOSTEVM *angustifolium*, floribus oppositis pedunculatis. Linn. Sp. pl. 250.

Lonicera humilis hirsuta etc. Gron. virg. 143.
ed. n. 31.

LOC. Virginia.

Biennis.

QUAL. eadem.

VSVS: Dysenteria; quam maxime laudatur.

CONOCARPVS crecta foliis lanceolatis.

Linn. Sp. pl. 250. — Button - wood.

LOC. Insulae Bahamenses.

Corticis decoctum ut antisyphiliticum laudatur.

53. VERBASCUM *Thapsus*, foliis decurrentibus utrinque tomentosis. *Linn. Sp. pl.* 252. *Mat. med.* 157. *Gr. virg.* 31.

LOC. Rhodisland. -- Virginiae, sterilia.

Biennis; vulgaris.

PHARM. *Verbasci* Herba, ☉, ∇, Flores.

QUAL. subodorata, fatuo-amaricans.

Rarior, Fl. Superflua.

VIS: anodyna, antispasmodica; emolliens, repellens.

VSVS: Haemoptysis, Phthisis? Haemorrhagia, Proctalgia.

54. DATURA *Stramonium* pericarpis spinosis erectis ovatis glabris. *Linn. Sp. pl.* 255. *Mat. med.* 159. *Gr. virg.* 23. *ed. n.* 31.

LOC. Rhod-Island. -- Virginiae, ruderata.

Annua, frequentissima.

PHARM. *Stramonii* Herba, Semina. *Stinck-weed.*

QUAL. narcotica.

VIS: refrigerans. *Clayt.*

VSVS: Combustura.

Indigenae folia temporibus aegrotorum applicant, somni conciliandi gratia. Folia externe applicata in Podagra utilia habentur; contrita Ulcera chronica sanare dicuntur. Semina, in dolore a Calculo.

55. HYOSCYAMUS *niger*; foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 257. *Mat. med.* 160.

LOC. Rhod-Island. -- Novebor. ruderata. hospitans? —

Biennis.

PHARM. *Hyoscyami* Radix, Herba, Semina, ☉.

QUAL.

QUAL. subinsipida, virofa, toxica.

Rarior, cauta.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, antispasmodica, repellens.

VSVS: Odontalgia, (fumus) Epilepsia, Haemoptysis, Varix ani.

COMP. Philonium, Pil. Cynoglossae, Ung. populneum.

56. NICOTIANA *Tabacum*, foliis lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis.

Linn. Sp. pl. 258. Mat. med. 161.

LOC. Marylandia, — Florida.

Culta, frequentissima.

PHARM. *Tabaci* Herba, Pulvis, $\circ\circ$, Extractum Gr. ij. Syrupus $\text{z}ijj$. Semina.

QUAL. nauseosa, virofa, toxica, acris.

Trita, praeftans.

VIS: anodyna, antispasmodica, paregorica, narcotica, vomitoria, errhina: Sem. anthelmintica.

VSVS: Ulcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tussis, Tertiana, Pleuritis, Syr. Asthma, Colica, Hysteria, Dysenteria, Icterus, Scirrhus, Hydrops.

COMP. Ungu. Nicotianae.

57. PHYSALIS *viscosa*, foliis geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato. *Linn. Sp. pl. 261.*

Physalis radice perenni, foliis cordatis obtusis.

Gr. virg. 25. ed. nov. 32.

LOC. Rhodisland. — Virginia.

Biennis.

PHARM.

QUAL. Odor plantae nauseosus, teter.

vis: Fructus diureticus insignis. *Clayt.*
Baccæ a pueris comeduntur.

58. SOLANVM *Dulcamara* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Linn. Sp. pl.* 264. *Mat. med.* 165.

LOC. Long-Island; ad sepes inveni. *Frutex.*

PHARM. *Dulcamaræ* Stipites. ℥ij.

QUAL. nauseosa, dulcis

vis: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.

vsus: Contusio, Rheumatismus, Arthritis, Icterus, Pleuritis, Peripneumonia, Asthma, Dyslochia, Scabies.

comp. Decocta mundificantia; Infus. traumaticum *Full.*

59. SOLANVM *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nantibus. *Linn. Sp. pl.* 266.

Var. *ε. virginicum* ramis angulatis dentatis, foliis integerrimis glabris. *Linn. Sp. pl.* 266.

Gr. virg. ed. n. 32.

LOC. Rhodisland. — Virginia.

Annua.

PHARM. *Solani* Herba, ∇, ⊙.

QUAL. virofa.

Rarior.

vis: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.

vsus: Phlegmone, Proctalgia, Scirrhus, Paronychia.

comp. Empl. de Solano. — Contusa fronti imposita capitis dolores lenit. *Vogel.*

SOLANVM *tuberosum* — Cultum ubique.

CAPSI.

CAPSICVM *annuum* -- hospitans in hortis fere omnibus.

60. CHIRONIA *angularis*, herbacea caule acut-angulo, foliis ovatis. *Linn. Sp. pl.* 262. *Wild - Succory.*

LOC. Pennsylvaniae, Noveboraci, Virginiae, nemora, ficca. *Annua.*

PHARM. *Chironiae* Herba.

QUAL. aromatica, amara,

VIS:

VSVS: Infusum in Febribus,

61. SIDEROXYLON *lycioides*, spinosum, foliis deciduis. *Linn. Sp. pl.* 279. Canadae frutex.

Turled-Bay? *Hamburg. Magaz. XVII. p.* 507. Georgiae frutex.

Baccae nigrae dulcescentes, ad Diarrhoeam prodesse dicuntur.

62. CEANOTHVS *americanus*, foliis triner-
viis. *Linn. Sp. pl.* 284. *Mat. med.* 175. *Gr.*
virg. 25. *ed. n.* 32. *Mill. ic. t.* 86. — *Red-*
root.

LOC. Noveboracum, Carolina. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. *Ceanothi* Folia, Radix.

QUAL. adstringens. (Decoct. rad.) rubro-tinctoria.

VIS: purgans. (Dec. rad.) purificans, fol.

Culinaris, usitata.

VSVS: Syphilis eiusque symptomata. Tumores chronici.

Decoct. colorem limpidum Vini Maderani acquirit.

RIBES *rubrum*. Linn. Spec. pl. 291. M. med. 176.

In hortis et sepibus hospitatur.

63. RIBES *nigrum*, inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. Linn. Spec. pl. 291. Mat. med. 177.

LOC. Noveboracum — Pensylvania. Frutex.

PHARM. Ribium nigrorum Herba, Baccae siccae, Syrupus.

QUAL. acidiuscula, Hb. tetra. Rarior, praestans. vis: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans.

vsvs: Angina! Febres exanthematicae, Rabies, Hydrophobia, Dysenteria! Ictus Serpentum.

64. HEDERA *quinquefolia*, foliis quinatis ovatis ferratis. Linn. Sp. pl. 292. Gr. virg. 24. ed. n. 34. Cold. nov.

Hederae arboreae, Europ. apte substituenda.

LOC. Canada — Virginia. Frutex.

PHARM. Hederae Lignum, Folia, Refina, Baccae.

QUAL. Fol. amara. Bacc. acida.

Rarior praestans.

vis: vulneraria, sophisticans.

vsvs: Ulcera, Fonticuli, Atrophia, Rhachitis, Ozaena, Epiphora. — Folia aceto macerata Clavos pedum sanant.

65. VITIS *vinifera* foliis lobatis sinuatis nudis. Linn. Sp. pl. p. 293. Mat. med. 179.

LOC. Orbis totus temperatus.

PHARM. Vitis Folia. Passulae, Vinum, Acetum.

QUAL. acido - dulcis.

vsvs:

vsus: Tussis, Stranguria.

COMP. Syr. Althaeae; Syr. Erysimi; Syr. Hyssopi. Passulae laxativae.

Vitis Labrusca. Sp. pl. ib. Gr. virg. ed. n. 34.

Vitis vulpina. ib. ib.

PLUMERIA alba. Linn. Sp. pl. 306. Mat. med. 184.

Loc. Insulae Bahamenfes.

Frutex.

Radix antisyphilitica.

DIGYNIA.

66. APOCYNVM *androsaemifolium*, caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus. Linn. Sp. pl. 314. — L'ouatte, Canadens.

Loc. Canada — Virginia.

Biennis.

QUAL. Succus plantae lacteus linguam urens, et effluvia plantae aequae suspecta ac Toxicodendri.

67. ASCLEPIAS *syriaca*, foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus. Linn. Sp. pl. 313. Gr. virg. 26. ed. nov. 37. Kalm. it. 3 p. 259.

Loc. Canada — Virginia. Sicca.

Biennis.

Planta succo scatet lacteo subacri. Turiones cocti et modo asparagi praeparati, sine noxa eduntur. Ex succo florum expressio Saccharum brunneum, saporis haud ingrati, coquunt Canadenses.

Cortice huius plantae tapistra fetasque texunt monticolae. Clayt.

68. ASCLEPIAS

LOCVS Noveboraciarida.

VSVS: Radicis infusum spirituosum in Rheumatismo. Decoctum Catharticum. Radix optimum esse creditur antidotum Veneni Aethiopum. (Negro - Poyson.)

69. ASCLEPIAS *tuberosa*, foliis alternis lanceolatis, caule divaricato piloso. *Linn. Sp. pl.* 316. *Amoen. acad.* 4. p. 517. — *Canada-root.*

LOC. America borealis.

Biennis.

PHARM. *Asclepiadis tuberosae* Radix.

QUAL. leniter adstringens.

VIS: diaphoretica. 3j.

VSVS: Colica, pulv. radic. — Hysteria. Haemorrhagiae; decoct. aquos. -- Dysenteria, decoct. vinosum!

70. CHENOPODIUM *Bonus Henricus*, foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis. *Linn. Sp. pl.* 318. *Mat. med.* 187. *Gron. virg. ed.* 15. 38.

LOC. Virginiae ruderata.

Perennis.

PHARM. *Boni Henrici* Herba.

QUAL. oleracea.

Rarior.

VIS: refrigerans, humectans, vulneraria.

VSVS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthisis.

71. CHE-

68. *Caulis* erectus, teres, villosus, robustus, tripedalis. *Folia* breviter petiolata, opposita, lanceolata, acuminata, basi cordata, 5-6 poll. longa, 2 circiter lata. *Umbellae* erectae; una terminalis, et una alterave lateralis; pedunculo communi pubescente. *Involucri* foliola linearia. *Calyx* reflexus. *Flores* pallide purpurei. *Nectaria* erecta, corniculata. *Odor* florum debilis.

71. CHENOPODIUM *album*, foliis rhomboideo-triangularibus erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *Linn. Sp. pl.* 319. *Gr. virg.* 39.

Inter obsonia receptum noxium esse creditur.

72. CHENOPODIUM *ambrosioides*, foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Linn. Sp. pl.* 320. — *Mexican Tea*.

Loc. Mexico, et aliae Am. sept. regiones.

Annua.

PHARM. *Chenopodii ambrosioidis* Herba.

QUAL. fragrantior quam Botrys.

VIS: resolvens, pellens --

VSVS: Morbi pectoris.

Chenopodium multifidum — Pennsylvaniae?

Odore et sapore aromatico, viribusque praecedenti simile, sed debilius.

73. CHENOPODIUM *anthelminthicum*, foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Linn. Sp. pl.* 320. *Amoen. acad.* 4. pag. 532. *Mat. med.* 190. *Kalm. it.* 2. 283.

Botrys praecalta frutescens. *Gr. virg. ed. n.* 39. *Ierusalem-Oack.*

Loc. Pennsylvania.

Perennis.

PHARM. *Chenop. anthelminthici* Semina. \mathfrak{z} j. Succus expressi Cochli. j. pro infant.

QUAL. graveolens.

Eximia, usitata.

VIS: anthelminthica!

VSVS: Lumbrici. Remed. tutum et efficax.

74. BETULA *vulgaris* floribus congestis. *Linn. Sp. pl.* 322. *Mat. med.* 192. — *Beets*.

Loc.

Biennis, culta.

PHARM.

PHARM. *Betae rubrae*, Herba, Radix.

QUAL. aquosa, dulcis. *Culinaris, trita.*

VIS: diluens, humectans, errhina.

VSVS: Ophthalmia: Coryza sicca, Cephalalgia, Odontalgia.

75. SALSOLA *Kali*, herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. *Linn. Sp. pl.* 322. *Gr. virg.* 28.

SALSOLA *Tragus* herbacea erecta, foliis subulatis spinosis laevibus, calycibus ovatis.

Linn. Sp. pl. 322. *Gron. virg. ed. nov.* 38.

LOC. in maritimis falsis.

Annuae.

PHARM. Soda. \ominus .

VIS: stimulans, antacida, diuretica.

COMP. Sal. mirab. Glaub. Seignette etc. Sapo venetus.

Melior ex his paratur Soda, quam e Salicornia, quae interdum nullam dat.

76. VLMVS *americana*, foliis aequaliter serratis: basi inaequalibus. *Linn. Sp. pl.* 327. *Gr. virg.* 145. *ed. n.* 39. *Mill. Dict.*

LOC. Canada — Virginia.

Arbor.

PHARM. *Ulmi* Cortex medius:

QUAL. mucilaginosus.

VIS: subadstringens, consolidans.

VSVS: Vulnera, Morbi cutis.

77. VLMVS procerior foliis angustioribus, trunco per intervalla viminibus dense congestis infra ramos obsito. *Gron. virg.* 39? *Berg. mat. med.* 112.

Salve - Bark vulgo.

LOC.

LOC. America borealis, Iersea nova. *Arbor.*

PHARM. *Cortex unguentarius.*

QUAL. insipida, inodora, mucilaginosæ.

VIS: emolliens, obtundens, consolidans.

VSVS: Vulnera! *Berg.*

78. *SWERTIA difformis*, corollis quinquefidis: terminali sexfida, pedunculis longissimis, foliis linearibus. *Linn. Sp. pl.* 328. *Gr. virg.* 30. *ed. n.* 40.

LOC. Virginia.

Utilis est in febribus, ictero, mensibus suppressis, scorbuto, arthritide, et specificè in morfu canis rabidi. *Clayton.*

GENTIANAE variae in America occurrunt
Species:

Saponaria. *Gr. virg.* 29. *ed. n.* 40. *Cat.*

156. *I. t.* 70. *p.* 70.

villosa. *Gr. virg.* 145. *ed. nov.* 40.

quinquefolia. *Kalm. Linn. Spec. pl.* 333.

ciliata. In Canadae montibus. *L. Sp. pl.* 335.

quæ cunctæ qualitate sua magis minusve amara se commendant, viresque balsamicas, tonicas, stomachicas promittunt. Amaritiem tamen puriorem fortiolemque in Specie quadam, humili, foliis angustis, in Pensylvaniæ vallibus montanis (the Glades) deprehendi.

79. *ERYNGIVM foetidum*, foliis radicalibus subensiformibus serratis; floralibus multifidis, caule dichotomo. *Linn. Sp. pl.* 336. *Mat. med.* 198. *Mill. dict. n.* 10. *Gr. virg.* 30. *ed. n.* 40.

LOC. Virginiae et Americae Calidiora.

Schoepfli Mat. med.

C

PHARM.

PHARM. *Eryngii foetidi* Herba, Infusum.

QVAL. foetida.

VIS: Antihysterica, alexipharmaca.

VSVS: Morfus Crotali aliorumque serpentum venenatorum. In febribus idem praestat quod Contrajerva. Clayton.

80. SANICVLA *marylandica* flosculis masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. Linn. Sp. pl. 339. Gr. virg. 31. ed. n. 42. Mill. dict. — Black-Snakeroot.

LOC. Novangliae — Virginiae; sylvae. Perennis.

PHARM. *Saniculae* Radix.

QVAL.

VIS:

VSVS: In Morbis variis laudatur. Fibrae radicis pro setaceo in tumoribus equorum debellandis apte adhibentur.

81. DAVCVS *Carota* feminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. Linn. Sp. pl. 348. Mat. med. 203. Gron. virg. 31. ed. n. 42. — Wild Carrot.

LOC. Novangliae — Virginiae Campi. Biennis.

PHARM. *Dauci* sylvestris f. sativi Semina.

QVAL. aquoso-aromatica, fragrans.

VIS: diluens, humectans, carminativa, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Stranguria, Calculus.

COMP. Sem. IV. calida majora.

82. CONIVM *maculatum* feminibus striatis. Linn. Sp. pl. 349. Mat. med. 204.

LOC. Long-Island - Rhode-Is. Biennis.

PHARM. *Conii* Herba, Succus, Extractum.

QVAL.

QVAL. tetra.

VIS: narcotica, venenata.

VSVS: Scirrhus, Scrophula, Carcinoma, Ulcus,
Scabies —

83. ANGELICA *sylvestris* foliis aequalibus ovato-lanceolatis ferratis. *Linn. Sp. pl.* 261. *Mat. med.* 213. *Gr. virg.* 31. *ed. nov.* 43. — *Angelica-root.*

LOC. Virginiae — Noveboraci *sylvestria* sub-
humida. *Biennis.*

PHARM. *Angelicae sylvestris* Radix. Aqua, Her-
ba, Semina, Spiritus, $\circ\circ$, Balf., Extr.

QVAL. acris, amara, fragrans, aromatica, ca-
lida.

VIS: alexiteria, resolvens, carminativa, em-
menagoga.

VSVS: Hysteria.

Semina capiti inspersa pediculos occidunt.

84. ANGELICA *atropurpurea* extimo foliorum pari coadunato: foliolo terminali petiolato. *Linn. Sp. pl.* 361.

LOC. Canada. — Radice huius venenata se
occidere, Indigenae Canadenses dicuntur.

85. ANGELICA *lucida* foliolis aequalibus ova-
tis inciso-ferratis. *Linn. Sp. pl.* 361. *Gr. virg. ed. n.* 43.

Radix ob vires summas carminativas nostrati-
bus *Belly-ach-root*, h. e. Torminum ventris
radix merito audit; et revera in morbis ven-
triculi et intestinorum a causa frigida, prae-
sertim Colica flatulenta et hysterica exper-

tum est remedium; neque minus efficax in Apepsia et Anorexia, indeque orta Mensium suppressione et Chlorosi. *D. Mitchel. synopsis. vir.* - vid. *Gr. loc. cit.*

86. **SISON** *canadense*, foliis ternatis. *Linn. Sp. pl.* 363. *Gron. virg.* 147. *ed. n.* 44. *Kalm. it.* 3. *p.* 259.

LOC. Canada — Virginia.

VSUS: Herba, Cerefolii loco adhibetur, verno tempore.

87. **CICVTA** *maculata* foliorum ferraturis mucronatis, petiolis membranaceis apice bilobis. *Linn. Sp. pl.* *p.* 367.

Aegopodium. Gr. virg. 32. *ed. n.* 44.

Angelica virginiana etc. Cumini sapore et odore. *Morif.*

LOCVS: Virginiae aquosa.

Ob affinitatem genericam cum *Cicuta virofa* partim, suspecta esse deberet; id quod testimonium *Schwenkii, de cicuta aquatica p.* 28, confirmat, qui hanc plantam Cephalalgiam et vertiginem causare dicit.

88. **PASTINACA** *fativa*, foliis simpliciter pinnatis. *Linn. Sp. pl.* 376.

LOC.

Biennis, oleracea.

PHARM. *Pastinacae* Radix, Semina.

QUAL. aquosa.

Culinaris, Rd. superflua.

VIS: diluens, humectans, nutriend; flatulenta, aphrodisiaca, diuretica.

VSUS: Tertiana. Sem.

IMPERATORIA *Ostruthium*. L. Sp. pl. 371.

Mat. med. 224.

LOC. Hospitans in hortis Lancaster etc. *Perennis*.

PHARM. *Imperatoriae* Radix.

QUAL. amaro-acris, aromatica, calida.

Trita, præstans.

VIS: apoplegmatisans, carminativa, sudorifera, emmenagoga.

VSUS: Flatulentia, Hysteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyfis.

COMP. Acet. Theriacale. etc.

89. THAPSIA *trifoliata*, foliis ternatis ovatis.

Linn. Sp. pl. 376.

Sium folio infimo cordato, caulinis ternatis: omnibus crenatis. Gr. virg. 31. ed. nov. 43.

LOC.

VIS: Vulneraria habetur.

Ad hanc speciem referendam esse credo Plantam, folio radicali reniformi, glabro, serrato; cuius radices vena media caerulea distinguuntur. — Monticolae Pensylvanici illam antisymphiliticam esse, mihi indicabant. *)

TRIGYNIA.

90. RHUS *glabrum*, foliis pinnatis ferratis lanceolatis, utrinque nudis. Linn. Sp. pl. 380.

Gron. virg. 148. ed. nov. 45. Cold. noveb. 63.

Kalm. it. 2. pag. 211. Catesb. Carol. 3. t. 3.

p. 3.

C 3

LOC.

*) Umbellataefacile omnes virtute medica pollent. Huius ordinis naturalis individua in America rariora.

LOC. Americae septentrionalis altiora, ad agros et sepes. *Frutex.*

PHARM. *Sumach* Semina, Folia, Sal essentielle, Radix.

QUAL. Baccae acida, styptica.

VIS: adstringens, coriaria.

VSVS: Dyfenteria, (Cort. Rad. decoct.) — Tinctorius.

Baccae Rhois glabrae, media aestate saepe efflorescentia alba, quasi salina, obductae sunt; saporis valde acidi. Indigenae hac substantia ad carnes condiendas utuntur. — Ex baccarum libris duabus, elixatione et evaporatione, crystallos puras pellucas ad pondus drachmarum 6, et Sali Acetosellae analogas, obtinuit Celeb. *Tromsdorf.* vid. *Taschenbuch für Scheidekunstl.* 1781. p. 12. Folia Tabaco intermixta fumum aromaticum et gratum Indigenis reddunt.

91. RHVS *Vernix*, foliis pinnatis integerrimis annuis opacis, petiolo integro aequali. *Lim. Sp. pl.* 380. *Mat. med.* 235. *Gr. virg.* 148. *ed. n.* 45. *). *Cold. noveb.* 64.

Sits vel Sitz diu. *Kaempf. amoen.* 791. t. 792.

LOC Novangliae — Virginiae paludosa. *Arbor.*

PHARM. *Vernicis* Resina, Oleum dest.

QUAL.

*) Haec vera est arbor Vernicem Iaponicam selectissimam stillans, vernicem Chinesem et Siamesem multum superantem. Cortex arboris cultro vulneratus lacteum succum fundit, humore quodam crystallino ex aliis ductibus stillante permixtum, in aere nigrescentem: Surculi divulsi, foliorum petiolus et nervi eundem succum produunt, nullius omnino saporis, sine acredine parum calefacientem. Liquor ex caudicibus praecipue triennibus excipitur, iterata sectione, donec exsuccum marcescant. Succo orbatu caules amputandi, et nova e radice

QVAL. toxica.

Externa.

VIS:

VSVS: Haemorrhoids.

COMP. Ungu. Martatum.

RHVS *Copallinum*, foliis pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. *Linn. Sp. pl.* 380. *Gr. virg.* 149. *ed. n.* 45. *Cold. noveb.* LOC antecedentis.

PHARM. Copal. Refina. *L. Mat. med.* I. nr. 152.

92. RHVS *radicans*, foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis, caule radicante. *Linn. Sp. pl.* 381. *Gron virg.* 33. *ed. n.* 45. *Cold. noveb.* *Kalm. it.* 2, 296, 215. — *Poyson-Oak.*

LOC. Canada — Virginia.

Frutex, scandens (etiam erectus).

PHARM.

QVAL lactescens; lac chartam et lintea nigro inquinans.

VIS:

VSVS: Radices a nonnullis in Asthmate chronico bono cum successu adhibebantur in Lancaster.

93. RHVS *Toxicodendron*, foliis ternatis: foliolis petiolatis angulatis pubescentibus, caule

C 4

ra-

e radice proveniet soboles. Per duplicatam chartam subtilissimam, telae aranearum pene similem, torqueri solet, ut a particulis heterogeneis mundetur; mundatae centesima circiter pars Olei Toi dicti, e Bignoniae tomentosae fructu expressi, admiscetur, et sic vasis ligneis induta, vel pura, vel colorata, cinnabari nativa, sive atramenti materia, per Japoniam venalis fertur. Oleum seminum expressum pro Candelis inservit. *Thunberg. fl. Japon.* p. 12.

radicante. *Linn. Sp. pl.* 381. *Gron. virg.* 149.

ed. n. 46 *Cold. noveb.* — *Poyson-tree*, wood.

LOC. Canada — Virginia. *Frutex.*

PHARM.

QUAL. lactescens, acris. Lintea colore nigro, aqua non delendo, inquinat.

VIS: rubefaciens, vesicans, inflammans.

VSVS: externus! in exanthematibus retropulsis, ophthalmia pertinaci — ? Experimenta cum succo foliorum instituere suadet *Ingenhous's Versuche mit Pflanzen* p. 184.

Succus lacteus guttatim cadit, qui aeri expositus mox nigrescit.

Vapores venenati, ex omnibus arboris partibus contusis exhalantes, seu potius guttulae e foliis exsudantes, pustulas acres, tumores doloresque in corpore (non omni) pariunt.

Clayt. —

Succus cani, interne datus, non nocuit.

VIBURNUM *prunifolium* foliis subrotundis crenato-ferratis glabris. *Linn. Sp. pl.* 383. *Gr. virg.* 33. *ed. n.* 47. *Cold. noveb.* 57. — *Black-Haw.*

Baccae acido-dulces eduntur.

94. CASSINE *Peragua*, foliis petiolatis acutiusculis, ramulis ancipitibus. *L. Mat. med.* 236. *Mill. ic.* t 83. f. 1.

LOC. Virginia, Carolina.

Arbor.

PHARM. *Peraguae* Folia.

QUAL. amara.

VIS: vomitoria, purgans, sudorifera.

VSVS: Diabetes! Colica calculosa.

95. *SAMBUCUS canadensis*, cymis quinquepartitis, foliis subbipinnatis, caule arboreo. *Linn.*

Sp. pl. 385. *Gr. virg. ed. nov.* 47.

LOC. Noveboracum — Virginia.

PHARM. *Sambuci* Cortex interior, Folia, Flores, Conserva, ∇ , \sqcup , Acetum, Baccae, Rob, Semina, \odot .

QUAL. acris, tetra, foetida, nauseosa.

Trita, eximia.

VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, sudorem, urinam, menstrua, lac.

VSUS: Erysipelas, Febres, Rheumatismus, Arthritis, Exanthemata, Fl; Rob; Dysenteria Bacc; Hydrops; Varix Ani! Cort. Odontalgia. Cort. int. decoctus, Externe. *Kalm.*

COMP. Species pro Cataplasmate.

Arboris umbra noxia. Gallinas baccae necant.

96. *SAROTHTHA gentianoides*. *Linn. Sp. pl.* 391.

Amoen. acad. 3. p. 11. 4. p. 518. *Kalm. it.* 2. p. 253.

Gentiana caule ramisque ramosissimis. *Gr. virg.* 29. *ed. n.* 47. — Ground-pine.

LOC. Pensylv. — Virginiae glareosa.

QUAL. gravcolens. — Herba recens.

VIS: Vulneraria dicitur.

VSUS: Contusiones, Contracturae.

COMP. Unguenta, cum Conila, Conis et Hyoscyamo.

Alfina media, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Sp. pl.* 389. *Gr. virg.* 161.

Antiscorbutica et phthificis salutaris esca aestimatur.

PENTAGYNIA.

97. *ARALIA spinosa*, arborescens, caule foliisque spinosis. *Linn. Sp. pl.* 329. *Amoen. acad.* 4. pag. 521. *Gr. virg.* 34. ed. n. 48. —
Tooth-ash tree. Angelica-tree.

LOC. Novebor. — Virginia. *Frutex.*

PHARM. *Araliae spinosae* Cortex. — Folia, Pericarpia.

QUAL. Sapore fervido, aromatico.

VIS: sudorifera.

VSVS: Hydrops, Rheumatismus, Tussis, Syphilis, Cort. decoct. Rheumat. chronicus. Cort. tinctura spirituosaf!

98. *ARALIA racemosa*, caule folioso, herbaceo laevi. *Linn. Sp. pl.* 393. *Amoenit. acad.* 4. p. 513. 521. *Cold. noveb.* 67. *Spikenard, Wild.*
Liquorice.

LOC. Noveboracum, Pennsylvania. *Biennis.*

PHARM. *Araliae racemosae* Radix, Baccae.

QUAL. mucilaginosa, balsamica? lactescens, suaveolens. Rd.

VIS: vulneraria, pectoralis.

VSVS: Pectoris morbi, Baccae; Cardialgia et alii morbi ventriculi. Dolores lumborum, Vulnere, Radix masticata; Ulcera recentia; Rad. decoct. saturatum mucilaginofum.

99. *ARALIA nudicaulis*, caule nudo, foliis binis ternatis. *Linn. Sp. pl.* 304. *Amoen. acad.* 4. p. 513, 531. *Cold. noveb.* 66. *Gr. virg.* 34. ed. 48. — *Saffaparill.*

LOC. Noveboracum. — Virginia. *Biennis.*

PHARM.

PHARM. *Araliae nudicaulis* Radix.

QVAL. Rd. balsamica, suaveolens.

VIS: Sanguinem depurans; Saffaparilla vulgari efficacior. *Colden.*

VSVS: Languor, Cachexia, Hydrops; Rd. decoct. — id. externe in Ulceribus impuris et Herpete (Shingles) laudatur, et Erysipelate.

COMP. Radix contusa cum Refina Pini, Cataplasmatibus loco ad Mammas exulceratas extollitur. Corticem radice contusum indigenae vulneribus adplicant.

100 STATICE *Limonium*, scapo paniculato tereti, foliis laevibus enerviis subtus mucronatis. *Linn. Sp. pl.* 394. *Gr. virg.* 150. *ed. n.* 48.

LOC. Novebor. — Virginiae Maritima.

PHARM. *Beben rubri* Radix.

QVAL. styptica.

Exoleta, superflua.

VIS: adstringens.

VSVS: Debilitas, Haemorrhagia.

101. LINVM *usitatissimum* calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subfolitario. *Linn. Sp. pl.* 307. *Mat. med.* 242.

LOC. Amer. Septentr. provinciae omnes.

Annua, cerealis.

PHARM. *Lini sativi* Semina, Oleum.

QVAL. pinguis.

VIS: relaxans, obtundens, emolliens.

VSVS: Arthritis, Calculus, Colica, Haemoptysis, etc.

Linum virginicum, catharticum Claytono (Gr. *virg.* ed. n. 48.) dictum; an vires *Lini cathartici* Linn. habet?

102. DROSER A *rotundifolia* scapis radicatis, foliis orbiculatis. Linn. Sp. pl. 402. Gr. *virg.* 35. ed. n. 48. Mat. med. 244.

LOC. Noveboraci — Floridæ paludes. Biennis.

PHARM. *Roris Solis* Herba.


QUAL. subacris, lactaria.

Exoleta, dubia.

VIS: Corrodens, suspecta.

VSVS: Verruca? Clavus?

Ovibus noxia censetur. Clayt.



CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

BROMELIA *Ananas* foliis ciliato spinosis mucronatis, spica comosa. *Linn. Sp. pl.* 480.
Mat. med. 246.

LOC. Insulae Bahamenses; Mansueta in Florida.
Perennis.

PHARM. *Ananas* Fructus, Cortex exterior (recens.)

QUAL. acris, ambrosiaca.

VIS: emmenagoga!

Inusitata.

VSVS:

PANCRATIVM *caribaeum?* *carolinianum?*
littorale? *Linn.*

Ad unam alteramve huius generis speciem referenda est sine dubio, planta ad Insularum Bahamensium littora arenosa crescens, cuius radix bulbosa, omnibus Radicis Scillae viribus praedita, eodem cum successu omnibus indicationibus respondet, proque eadem venditur.

103. ALLIVM *canadense*, scapo nudo tereti, foliis linearibus, capitulo bulbifero. *Linn. Sp. pl.* 413. *Gron. virg.* 50. *Kalm. it.* 3. 79.
Mill. Dict. 19. — *Garlick. Landlauch.*

LOC. Canadae — Virginiae campi arenosi.

Perenne.

QUAL.

QVAL. Odore gravi alliaceo lac bytyrumque vernum inficit.

VIS:

VSVS: Infusum spirituosum ad Calculum.

ALLIVM *Porrum*, L. Sp. pl. 423. Mat. m. 246.

sativum, Linn. Sp. pl. 425. Mat. med. 248.

Cepa, L. Sp. pl. 431. Mat. med. 249.

Coluntur in hortis fere omnibus.

104. UVVLARIA *perfoliata*, foliis perfoliatis.

Linn. Sp. pl. 437. Amoen. acad. 2. p. 337. 4.

p. 516. Gr. virg. 37. ed. n. 51. Cold. nov. 74.

LOC. Canadae — Virginiae humida.

PHARM. *Uvulariae* Radix, Herba.

QVAL.

VIS: maturans, aperiens.

VSVS: Radix aqua contusa ad Vulnera Caudifonae; aliaque vulnera et ulcera. Herbae decoctum ad inflammat. oris, laryngis, tonsillarum.

105. HYPOXIS *erecta*, pilosa, capsulis ovatis.

Linn. Sp. pl. 439. — Star of Bethlehem.

Ornithogalum. Gr. virg. ed. nov. 51. Cold. noveb.

LOC. Canada — Virginia.

Biennis.

PHARM.

QVAL.

VIS:

VSVS: Ulcera chronica, Intermittentes.

106. ASPARAGVS *officinalis*, caule herbaceo

tereti erecto, foliis setaceis, stipulis pari-

bus. Linn. Sp. pl. 448. Mat. med. 253.

LOC. Noveboraci — Virginiae arenosa. *Perennis.*

PHARM.

PHARM. *Asparagi* Radix, Semina.

QUAL. aquosa, subdulcis, inodora, urinaria, foetida.

VIS: nutriend, diluens, humectans, debilitans, mundificans, diuretica, aphrodisiaca.

VSVS: Calculus.

COMP. Rad. V. aperientes. Syr. *Althaeae*.

107. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Linn. Sp. pl.* 451. *Gr. virg.* 37. ed. n. 52. *L. Mat. med.* 255. *Cold. noveb.* — *Weiswurzel*.

LOC. Virginia.

Perennis.

PHARM. *Sigilli Salomonis* Radix.

QUAL. fatua, mucilaginoso; farinosa.

Exoleta, dubia.

VIS: cosmetica? vulneraria.

VSVS: Sugillatio. Ophthalmia, Rd. contusa.

Radix siccata, trita, cribrata panem praebet album et bonum. *Act. Acad. Holm. Vol.* 34. p. 150.

Convallariae Species? caule debili flexuoso semipedali, foliis alternis lanceolatis acuminatis glabris, 3- nerviis; foliis in caule tantum 3. 4. 5. etc. prope Libanon Pennsylvaniae mihi monstrata fuit, et eius radicem ad Morfuram Serpentis Caudisonae praestare narratum est. Flores non vidi.

108. CONVALLARIA *racemosa*, foliis sessilibus, racemo terminali composito. *Linn. Sp. pl.* 452. *Gr. virg.* 38. ed. nov. 52.

LOC. Canada — Virginia.

Biennis.

VIS:

vis: Baccae cephalicae et cardiacaе genus nervosum confortant. *Clayton.*

109. *ALETTRIS farinosa*, acaulis, foliis lanceolatis membranaceis, floribus alternis. *Linn. Sp. pl.* 456. *Amoen. acad.* 3. p. 11. 4. p. 56.

Hyacinthus. Gr. virg. 38. *ed. nov.* 52. — *Star-grass. Star-root. Devils's-bit; Blazing-Star.*

LOC. Americae septentrional. pinguis. *Biennis.*

PHARM. *Aletris Radix.*

QVAL. amara.

vis: antifebrilis, leniter cathartica.

vsus: Morfus Caudifonae. — Infus. spirit. Dolores hysterici, Colica sicca.

110. *YVCCA gloriosa* foliis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 456. — *Palmetto-Royal.*

LOC. Carolina, Florida.

Perennis.

PHARM. *Yuccae gloriosae Fructus; pulpa.*

QVAL.

vis: eccoprotica.

111. *YVCCA filamentosa*, foliis serrato-filamentosis. *Linn. Sp. pl.* 457. *Gron. virg.* 152. *ed. n.* 53. — *Silkgrass.*

LOC. Virginiae — Floridae, arenosa. *Perennis.*

vsus: Radicis loco saponis: filamentorum et fibrarum fol. mechanicus.

ALOE perfoliata floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis. *Linn. Sp. pl.* 457. *Mat. med.* 256. β. *Aloe americana. Brown. jam.* 197.

LOC. Barbados, Bahamens. Insulae.

PHARM. *Aloe Succotrina.*

QVAL.

QVAL. amarissima, nauseosa. *Trita, beroica.*
 VIS: purgans, pellens, balsamica, stomachica,
 anthelminthica, vulneraria.
 VSVS: Obstructio, Hypochondriasis, Icterus,
 Vermes.

112. AGAVE *americana*, foliis dentato-spinosis,
 scapo ramoso. *Linn. Sp. pl. 461. Amoen.*
acad. 3. p. 22.

LOC. Florida, Mexico. *Perennis.*

VSVS: Medulla foliorum recentium cocta edi-
 tur; Citreum saccharatum sapore refert. Suc-
 cus radicum coctione Mel vel Saccharum
 praebet; fermentatione potum inebriantem.

113. ACORVS *Calamus.* *Linn. Sp. pl. 462. Mat.*
med. 267. Gron. virg. ed. n. 52.

LOC. Novae Angliae — Virginiae paludes.

Perennis.

PHARM. *Calami vulgaris* Radix, Condita, Ex-
 tractum, Aqua, Spiritus.

QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrans.

Vsitata, praeestans.

VIS: incidens, alexiteria! calefaciens, pellens,
 diuretica, stomachica.

VSVS: Anorexia, Febres exanthematicae ma-
 lignae! Vertigo.

COMP. Troch. acori. cet.

114. ORONTIVM *aquaticum.* *Linn. Sp. pl.*
463. Amoen. acad. 3. p. 17. t. 1. f. 3. Kalm.
it. 3. p. 54. Gr. virg. 113. ed. n. 52. Catesb.
Carol. 1. p. 82. t. 82.

LOC. Canadae — Floridae paludes, scaturigi-
 nes. *Biennis.*

Schoepfii *Mat. med.*

D

Toa-

Toakim Indigenarum, qui feminibus vescuntur.
Semina recentia valde acria. Radix recens
etiam valde acris, hominibus noxia creditur;
inter cineres cocta editur; Suibus accepta.

ACHRAS *Sapota*, floribus solitariis, foliis
ovato-oblongis. *Linn. Sp. pl.* 471. *Mat.*
med. 258. *Anona* foliis laurinis etc. *Catesb.*
Carol. 2. p. 87. t. 87. — *Sapodill.*

LOC. Insulae bahamenses etc. *Arbor.*

PHARM. *Sapodillae* Semina, Cortex.

QUAL. acris.

VIS: Semina valde diuretica.

VSVS: Colica nephritica. Morbi systematis uro-
poei, Dysuria. Semina decorticata plerum-
que 6 (interdum 12, sed non ultra) cum
aqua vel vino contusa, quotidie sumenda.

Cortice, loco Cortic. Chinae, utuntur.

BURSERA *gummifera*. *Linn. Sp. pl.* 471.
Cat. car. 1. p. 30. t. 30.

LOC. Insulae bahamenses. *Arbor.*

PHARM. *Burserae* Lignum, Cortex 3j, Gummi.

QUAL. inodora, insipida.

VIS: Simarubae analoga, sed debilior.

VSVS: Diarrhoea, Dysenteria. Gummi pro Bal-
samo vulnerario Hippiatrīs inservit.

115. PRINOS *verticillatus* foliis longitudinaliter
ferratis. *Linn. Sp. pl.* 471. *Gr. virg.* 39.
ed. n. 54. — *Winter-berry.*

LOC. Novae Angliae — Virginiae paludosa.

Frutex.

PHARM. *Prini* Cortex.

QUAL.

VIS:

vis: antiseptica.

vsus: Gangraena, Icterus.

PRINOS *glaber*, foliis apice ferratis. *Linn.*
Sp. pl. 471.

Cassine. *Mill. dict.* t. 83. f. 2. — Cassine. *Catesb.* 2. p. 57. t. 57.

Loc. Canada — Carolina.

Frutex.

Medic. Emeticum inde desumi mihi narratum est; sed nescio ex quam parte. —

Decoctum eius bibunt Indigenae Floridæ occidentalis, atque nomine liquoris Valoris (liquor of Valour) insigniunt; valde diureticum est. *Bosju.*

116. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemosis.
Linn. Sp. pl. 109. — *Barberry-bush.*

Loc. Novae Angliæ — Noveboraci Campi.

Frutex.

PHARM. *Berberidis* Cortex, Baccae, conditae, Succus, Syrupus, Rotulae, Semen. Sal.

QUAL. Baccar. acidissima; Cort. flava, amara.

Praestans.

vis: refrigerans, attenuans, antiputredinosa; Cort. tinctoria, purgans, tonica.

vsus: Febres putridae, Cholera; Cort. Icterus, Leucorrhoea, Aphthae.

Succi baccar. Berberid. ℥xxiv . Citri ℥ij . Misc. — seponatur per dies aliquot. Liquor. deinde clarus filtratur, ad punctum crystallizat. evaporatur, et loco frigido servatur, et ita Sal. cryst. Tartari analogum obtinetur. *Sim. Paulli. Quadrip. botan.* p. 105.

DIGYNIA.

117. ORYZA fativa. Linn. Sp. pl. 457. Mat.
 med. 260. Cat. Carol. 1. p. 14. t. 14. — Rice.
 LOC. Virginiae — Floridae inundata. Annua.
 PHARM. Oryzae Semina, Spiritus.
 QVAL. farinosa, dulcis. Culinaris, frequentissima.
 VIS: nutriens.
 VSVS: cibarius. (Diarrhoea, Dysenteria.)

TRIGYNIA.

118. RVMEX *sanguineus* floribus hermaphroditis:
 valvulis integerrimis: unica granifera, foliis
 ovato-lanceolatis. Linn. Sp. pl. 476. Mat.
 med. 261.
 LOC. Virginia. Biennis.
 PHARM. *Lapathi sanguinei* Radix, Succus, Semina.
 QVAL. purpurea, austera.
 VIS: adstringens, refrigerans.
 VSVS: Dysenteria! Vlcus.
119. RVMEX *Britannica*, floribus hermaphro-
 ditis, valvulis integerrimis: omnibus grani-
 feris, foliis lanceolatis: vaginis obsoletis.
 Linn. Sp. pl. 774. Amoen. acad. 4. p. 522. Gr.
 virg. 39. ed. nov. 55. Cold. noveb. 83.
 LOC. Novebor. — Virgin. Biennis.
 PHARM. *Britannicae* Radix.
 QVAL. styptica.
 VIS: adstringens.
 VSVS: Vlcera phagedaenica. Conf. Colden flor.

120. RVMEX *Acetofella*, floribus dioicis, foliis lanceolato hastatis. *Linn. Sp. pl.* 481. *Gr. virg.* 153. *ed. n.* 55.

LOC. Novanglia — Florida. *Biennis.*

PHARM. *Acetofellae* Radix, Herba.

QUAL. acido-austera.

VIS: refrigerans, subadstringens.

VSUS: Scorbutus.

Cancer-root, Sower-dock, quaedam Rumi-
cis Species appellatur, cuius Succus expres-
sus aceto mixtus contra Impetiginem (Ring-
worms) et Scabiem adhibetur.

MEDEOLA *virginiana*, foliis verticillatis, ra-
mis inermibus. *Linn. Sp. pl.* 483. *Gr. virg.*
39. *ed. n.* 55.

LOC. Nova Anglia — Virginia.

An haec vires Ipecacuanhae aemulatur? Con-
fer. *Linn. flor. lapp.* §. 155. γ. Quaerit Gro-
nov. loc. cit.

121. TRILLIVM *cernuum*, flore pedunculato
cernuo. *Linn. Sp. pl.* 484.

Paris. *Cold. noveb.* 81. *Gr. virg. ed. n.* 56.

LOC. Noveboracum — Carolina; uda. *Biennis.*

QUAL. Indigenae hanc plantam noxiam esse et
venenatam, *Coldenio* indicarunt.

122. TRILLIVM *sessile*, flore sessili erecto.
Linn. Sp. pl. 484. *Gr. virg.* 44. *ed. nov.* 56.
Solanum. Cat. car. 1. t. 50.


LOC. Virginia — Carolina. *Biennis.*

Baccae rubrae atramentum praebent rubrum;
cum alumine colorem cyaneum. Sapor acidus.

Alisma cordifolia — Acris; Bobus venenosa?

HELONIAS *bullata*, foliis radicalibus lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 485. *Amoen. acad.* 4. p. 517.
— *Star-grass*.

Loc. Novae Caesareae — Marylandiae depressa.
Decoctum ex radice paratum, alvi tormina levare fertur.





CLASSIS. VII.


HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

123. AESCVLVVS *Pavia*, floribus octandris. Linn.
Sp. pl. 489. Mill. ic. 198. Gr. virg. ed. n. 57.
— Scarlet - horse - Chesnut. — Poyson - root.
Dears - Eye. Bucks - Eye.
LOC. Virginia — Carolina. Frutex.
QUAL. Rad. saponaria, abstergens.
VSUS: Radix contusa, in aqua cocta, Saponis loco ad vestimenta lanca lavanda servit.

TRIGYNIA.

124. SAVRVRVS *cernuus*, foliis cordatis petiolatis, amentis solitariis recurvis. Linn. Sp. pl. 489. Amoenit. acad. 4. p. 514. Gr. virg. 40. ed. nov. 56. Cold. noveb. — Lizards - tail.
LOC. Noveboraci — Virginiae humida. Biennis.
PHARM. *Saururi* Radix, Folia.
QUAL. paregorica.
VIS: Radices molliunt, digerunt, maturant, discutunt. Clayton.
VSUS: Mammæ exulceratæ; Rad. Catapl. — Lumbago, et dolores pectoris, fol. infus.
-



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

TROPAEOLVM *majus* foliis peltatis sub-
 quinquelobis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 490.

Mat. med. 269. — *Indian-Cress.*

LOC. Peru.

Annua, mansueta.

PHARM. *Nasturtii indici* Herba, Flores.

QUAL. aquosa, acris, oleracea.

VIS: diuretica.

VSVS: Scorbutus, Scabies.

- 125. OENOTHERA** *biennis*, foliis ovato lanceo-
 latis planis, caule muricato subvillosa. *Linn.*
Sp. pl. 492. *Gr. virg.* 254. *ed. n.* 58. *Kalm.*
it. 3 509. — *Tree-Primrose. Herbe aux Anes.*

LOC. Canada — Virginia.

Vulneraria creditur. Radices juniores, in ci-
 bos et acetaria recipiuntur.

- 126. OENOTHERA** *molliſſima*, foliis lineari-
 lanceolatis undulatis. *Linn. Sp. pl.* 492. *Cold.*
noyeb. 87. *Gr. virg.* 42. *ed. n.* 59.

LOC. Noveboraci — Virginiae et Carolinae?
 campi,

Annua,

Folia vulneraria extrinsecus ad vulnera (et con-
 tusiones) creberrime usurpantur. *Clayton.*

AMYRIS *Elemifera*?

Frutex trifolius resinofus floribus tetrapetalis al-
 bis racemosis. *Catesb. car.* 2. *p.* 33. *t.* 33. *f.* 3.

127. VAC.

127. *VACCINIVM corymbosum*; floribus corymbosis ovatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 499.

VACCINIVM frondosum, racemis filiformibus foliosis, foliis oblongis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 499. *Gron. virg.* 155. *ed. nov.* 60. — *Whortle-berries. Huckle-berries.*

LOC. Canada -- Virginia.

Frutices.

PHARM. *Vaccinii* Baccae.

QUAL. acidula.

VIS: subrefrigerans, subadstringens.

VSVS: Diarrhoea, Scorbutus. — Feminam quamdam hydropicam hisce baccis fortuito magna copia comestis, convaluisse, mihi Philadelphiae narratum fuit.

128. *VACCINIVM hispidulum* foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus hispidis. *Linn. Sp. pl.* 501. *Gr. virg. ed. n.* 60. *Kalm. it.* 3. p. 37. — *Cranberries.*

LOC. Americae paludosa.

PHARM. *Oxycocci* Baccae.

QUAL. acida.

VIS: refrigerans.

VSVS: Febrium aestus.

DIGYNIA.

129. *POLYGONVM Bistorta* caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. Sp. pl.* 516. *Mat. med.* 277.

LOC. Insulae longae prata humida. (An hospitans?)

Perennis.

PHARM.

PHARM. *Bistortae* Radix.

QVAL. styptica, rubra.

VIS: adstringens.

VSVS: Dysenteria, Leucorrhoea, Stomacace, Profluvia.

130. POLYGONVM *Hydropiper*, floribus hexandris femidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. Sp. pl.* 517.

LOC. Noveboraci subhumida.

Annua.

PHARM. *Perficariae* Herba.

QVAL. acris, urens, lutea.

VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, stimulan-
s, diuretica.

VSVS: Calculus! Odontalgia, Excoriatura oris.

131. POLYGONVM *Perficaria*, floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. Sp. pl.* 518. *Gr. virg.* 157. *ed. n.* 61. — *Asthmat. Anglice.*

LOC. Noveboraci — Virginiae Culta. *Annua.*

VSVS: Folia contrita ulcera et excoriaturas Equorum sanant; lintea (cum alumine) colore flavo tingit.

132. POLYGONVM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Linn. Sp. pl.* 519. *Mat. med.* 279. *Gr. virg.* 44. *ed. n.* 61.

LOC. Novae Angliae — Virginiae culta, rudrata. *Annua.*

PHARM. *Centummodiae* Herba.

QVAL. subinsipida, inodora. *Exoleta, superflua.*

VIS: subadstringens, vulneraria.

VSVS: Prolapsus.

133. POLYGONVM *Eragopyrum* foliis cordato-fagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. *Linn. Sp. pl.* 522. *Mat. med.* 280. — *Buck-wheat.*

LOC.

Annua, cerealis.

PHARM. *Eragopyri* Semina.

QUAL. farinacea.

VIS: refrigerans, obstipans, nutriens.

VSVS: cibarius.

- SAPINDVS *Saponaria*, foliis impari pinnatis, caule inermi. *Linn. Sp. pl.* 526. *Mat. med.* 281.

LOC. Insulae bahamenses; Carolina (hospitans?)

PHARM. *Saponariae* Nuculae.


QUAL. spumescens; viscosa; subdulcis acri-amariuscula.

VIS: saponacea.

VSVS: Chlorosis! Leucorrhoea.

Ad lotionem linteorum inservit; quae tamen usu crebriori corrodit.





CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

134. LAVRVS *indica*, foliis venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemosis. *Linn. Sp. pl.* 529. *Gr. virg.* 159. *ed. n.* 63. *Mill. Dict. nr.* 4.

Loc. Virginia, Carolina. *Arbor.*

QUAL. Cort. acris, aromatica, Cinnamomo appropinquans. Folia masticata amaro-dulcia, mucilaginoso. Ramuli juniores et petioli, dulces, mucilaginosi.

LAVRVS *Persea*, foliis venosis ovatis coriaceis perennantibus, floribus corymbosis. *Linn. Sp. pl.* 529. — *Avogado Pear.*

Fructus (huius generis) maximus pyriformis viridis, pericarpio esculento butyraceo. Insulae Bahamenses etc.

135. LAVRVS *Borbonia*, foliis venosis lanceolatis, calycibus fructus baccatis. *Linn. Sp. pl.* 529. *Gron. virg.* 46. *ed. nov.* 63. *Catesb. Carol.* 1. p. 63. t. 36. *Mill. dict. n.* 5. — *Red-Laurel. Redbay.* *)

Loc. Virginia — Carolina, Georgia.

QUAL. Folia aromatica.

VSUS: Ligni: mechanicus.

135. LAV-

*) Hanc Laurum carolinensem *Catesb.* a *Borbonia Plum.* separandam esse iudicat *Trew* in *Nov. Act. A. N. C.* 2. app. p. 349.

136. *LAVRVS aestivalis* foliis venosis oblongis acuminatis annuis, ramis supraaxillaribus. *Linn. Sp. pl.* 529. *Gr. virg.* 159. *ed. n.* 63. *Cold. noveb.* 95. *Mill. dict. n.* 8. *Cornus* foliis salicis etc. *Catesb. Car.* 2. *p.* 28. *t.* 28? — *Allspice. Spice-berry.*

LOC. Noveboracum — Florida, ad ripas rivulorum. *Frutex.*

PHARM. *Lauri aestivalis* Cortex, Baccae, Oleum expressum.

QUAL. Ligni et foliorum sapor aromaticus debilior; fructuum fortior, sed minus gratus; oleoso - resinofus.

VIS:

VSVS: Febres intermittentes, (Decoct. foliorum) Rheumatismus, (oleum, externe). Oleum baccarum ad dolores colicos sedandos insigne. *Clayt.*

137. *LAVRVS Sassafras* foliis trilobis integrisque. *Linn. Sp. pl.* 530. *Mat. med.* 288. *Gr. virg. ed. n.* 62. *Cold. noveb.* 94. *Kalm. it.* 2. *p.* 270, 434. *Cornus Mas* odorata. *Catesb. Car.* 1. *f.* 55.

LOC. Nova-Anglia — Florida. *Arbor.*

PHARM. *Sassafras* Lignum, Cortex, Essentia, Aqua, Spiritus, Oleum.

QUAL. subdulcis, subacris, aromatica, fragrans, folior. mucilaginosa. *Trita, praeestans.*

VIS: diaphoretica, sudorifera, pellens, corroborans, emmenagoga, flor. resolvens, purificans. -- vulneraria, glutinans, sistens, folia masticata.

VSVS:

vsvs: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies,
Flatulentia, Catarrhus, Rheumatismus, Ar-
thritis, Scorbutus, Ulcera.

ANACARDIVM *occidentale*. Linn. *Sp. pl.*
548. *Mat. med.* 290.

Pomifera indica, nuce reniformi. *Catesb. Car.* 3.
p. 9. f. 9. — *Acajou*.

LOC. Insulae Bahamenses etc. *Arbor.*

PHARM. *Anacardii occidentalis* Nux. (Testae mel-
ligo.)

QUAL. melliginis exurens, nigra. *Exoleta.*

VIS: excorians, tinctoria.

vsvs: Maculae, Scabies, Impetigo.





CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

138. *SOPHORA tinctoria*, foliis ternatis subsessilibus: foliolis obovatis glabris. *Linn. Sp. pl.* 535. *Cold. noveb.* 165. *Gron. virg.* 82. ed. n. 64. — *Wild Indigo.*

Loc. Nova-Anglia — Virginia. *Perennis.*

Radicem decoctam contusam, Indigenae vulneribus sclopetariis applicant, et inflammationem inde moderari testantur. Tentarunt ex hac planta Smegma Indigo dictum conficere, verum successus minime respondebat. *Clayt.*

CERCIS canadensis, foliis cordatis pubescentibus. *Linn. Sp. pl.* 535. *Gr. virg.* 47. ed. n. 64. — *Salladtree.*

Loc. Nova-Anglia — Virginia. *Arbor.*

Flores, licet nullo fere sapore praediti, inter acetaria recipiuntur.

139. *CASSIA ligustrina*, foliis septemjugis lanceolatis: extimis minoribus, glandula baseos petiolorum. *Linn. Spec. pl.* 541. *Gr. virg.* 47. ed. nov. 65. — *Wild Senna.*

Loc. Virginia — Bahama. *Frutex.*

Flower fence. Folia vi purgatrice cum Sennae Alexandrinae foliis conveniunt. *Clayt.*

Idem valet de *Cassia marylandica* et *Chamaecrista.*

CAS-

CASSIA *biflora*. Linn. Sp. pl. 540. — *Po-
ckeroot*.

LOC. Bahama.

Radix antisyphilitica.

140. **CAESALPINIA** *brasiliensis* caule foliisque in-
ermibus. Linn. Sp. pl. 544. Mat. med. 299.

Pseudo Santalum croceum. Catesb. car. 2. t. 51.

LOC. Bahamae, Carolinae? Colles. Arbor.

PHARM. *Brasilense* luteum Lignum.

QVAL. flava. Exoleta:

VIS: tinctoria.

VSVS: oeconomicus.

GVAIACVM *officinale* foliolis bijugis obtusis.
Linn. Sp. pl. 546. Mat. med. 303.

LOC. Bahama. Arbor.

PHARM. *Ligni Sancti (Guaiaci)* Cortex, Spiritus,
Oleum, Refina, Extractum.

QVAL. sicca, amaricans, acriuscula.

Trita, praestans.

VIS: aperiens, purificans, pellens, visceralis;
Extr. sternutatoria.

VSVS: Syphilis, Leucorrhoea, Arthritis, Sca-
bies.

HAEMATXYLVM *Campechianum*. Linn.
Sp. pl. 549. Mat. med. 307. Catesb. Car. 2.
p. 66. t. 66.

LOC. Bahama. Arbor.

PHARM. *Campefcantum* Lignum; Extractum.

QVAL. styptica. Eximia.

VIS: adstringens, tinctoria.

VSVS: Dysenteria!

141. *SWIETENIA Mahagoni*. Linn. *Sp. pl.* 548.
Mat. med. 308.

Arbor foliis pinnatis, fructu anguloso, semine
 alato. *Cat. Carol.* 2. p. 81. t. 81.

LOC. Loc. Florida australior; Bahama. *Arbor*,
 PHARM. *Mahagony* Lignum.

QUAL. color brunneo-fuscus.

VIS: mechanica.

VSVS: oeconomicus. — Cort. Hemicrania.

142. *MELIA Azedarach*, foliis bipinnatis. Linn.
Sp. pl. 550. — *Bead-tree*.

LOC. Virginia — Carolina. *Arbor, cicur*.

PHARM. *Azedarach* Radix, Folia, Fructus.

QUAL. amara, ingrata.

VIS: purgans, Rad.

VSVS: In Malabarica decoctum foliorum ad mor-
 bos pestilenciales et malignos praestare credi-
 tur; cataplasmatibus forma ad morsuram ani-
 mal. venenatorum. Parenchyma fructuum cum
 butyro exhibitum canibus letiferum. Fructus
 ab avibus non tanguntur. — Fructus con-
 tusus et coctus preloque submissus oleum
 dat, consistentia sevi, quo pro candelis
 fundendis utuntur Iaponenses. *Thunberg*.

MONOTROPA *Hypopitys*, floribus latera-
 libus octandris, terminali decandro. Linn.
Sp. pl. 555.

LOC. Canadae sylvae. *Parasitica radicum*.

Plantam siccam ruricolae Sueci bobus et ovi-
 bus contra Tussim exhibent.

KALMIA *latifolia*, foliis ovatis, corymbis terminalibus. *Linn. Sp. pl.* 560. *Gr. virg.* 160. *ed. n.* 65. *Kalm. it.* 2. p. 43. et 3. p. 148.

KALMIA *angustifolia*, foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *Linn. Sp. pl.* 561. *Gr. virg.* 21. *ed. n.* 65. *Kalm. it.* 3. p. 147. — *Common Laurel.* Ivy.

LOC. Noveboracum — Carolina. *Frutex.*

Utraque Ovibus maxime noxia censetur. *Clayt. Colden.* A capris impune editur.

143. LEDVM *palustre*, foliis linearibus, subtus hirsutis. *Linn. Sp. pl.* 561. *Mat. med.* 311.

LOC. Nova Scotia. *Frutex.*

PHARM. *Rosmarini sylvestris* Herba.

QUAL. amaricans, nidorosa. *Heroica.*

VIS: narcotica, phantastica, cephalalgica, exanthematica, phthiriaca.

VSVS: Tussis ferina! Febres exanthematicae? Lepra, Scabies, Infecta.

RHODODENDRON *maximum*, foliis nitidis ovalibus obtusis venosis, margine acuto reflexo, pedunculis unifloris. *Linn. Sp. pl.* 563. *Kalmia Mill. Dict. t.* 229. *Chamerhododendron. Catesb. Car.* 2. p. 17. t. 17.

LOC. Novae-Caesareae — Carolinae rupestria humida. *Frutex.*

Petioli viscosi. Odor caulis, foliorum, capsularum fortis, teter, cimices referens, vires med. promittit.

ANDROMEDA *mariana*, pedunculis aggregatis, corollis cylindris, foliis alternis ovatis

tis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 564. *Gr. virg.* 49. *ed. nov.* 66.

LOC. Infulae longae campi — Virginia. *Frutex.*
Ovibus perniciofa habetur. — Huius, vel Kal-
miarum folia, forte Daphnes Mezerei vel
Laureolae foliis qual. analoga?

144. ANDROMEDA *arborea*, racemis secun-
dis nudis, corollis rotundo ovatis. *Linn.*
Sp. pl. 565. *Gron. virg.* 48. *ed. nov.* 67. —
Sorrel-tree.

Frutex fol. oblongis. *Cat. car.* 1. p. 71. t. 71.
LOC. Noveboracum — Carolina. *Frutex.*
Foliorum decoctum aestum febrilem mitigat,
sitimque sedat. *Clayt.*

145. GVALTHERIA *procumbens.* *Linn. Sp. pl.*
565. *Cold. noveb.* 98. — *Mountain-Tea.*
Ground-Ivy.

LOC. Canadae - Noveboraci sterilia arenosa.
Frutex.

PHARM. *Gualtheriae* Folia.

QVAL. Fol. amaro - aromatica; Fr. sapore et a-
dore dulci, grato.

VIS:

VSVS: Foliorum infusum theiforme.

146. ARBUTVS *Vva Vrsi*, caulibus procum-
bentibus, foliis integerrimis. *Linn. Sp. pl.*
566. *Mat. med.* 312. *Cold. noveb.* 104. —
Bearberry. *Sagack-homi* Indigenis.

LOC. Canada — Noveboracum. *Frutex.*

PHARM. *Vvae Vrsi* Folia.

QVAL. styptica, inodora, tinctoria.

Rarior, praestans.

vis: adstringens, coriaria, obstipans, diuretica.

vsus: Calculus! pulv. fol. 3℔.

Indigenae folia Tabaco admiscant.

Syrupus gratus, ex Baccis contusis, aqua calida infusis, colatis, inspissatis etc. *Aët.*

Acad. Suecic. Vol. 34. p. 275.

147. PYROLA *rotundifolia*, staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Linn. Sp. pl. 567.*

Mat. med. 313. Cold. noveb. 99.

LOC. Canadae – Virginiae sylvae. *Perennis.*

PHARM. *Pyrolae rotundifoliae* Herba.

QUAL. substyptica, inodora. *Rarior.*

vis: corroborans, adstringens.

vsus: Vulnus.

148. PYROLA *umbellata*, pedunculis subumbellatis. *Linn. Sp. pl. 567.*

LOC. America septentr. sylvae. *Fruticulus.*

PHARM. *Pyrollae umbellatae* Herba.

QUAL. styptica.

vis: corroborans, adstringens.

vsus: Ischias.

149. PYROLA *maculata* pedunculis bifloris. *Linn. Sp. pl. 567. Gr. virg. 48. ed. nov. 63.*

LOC. Americae septentr. sylvae. *Suffruticosa.*

Infusum foliorum, ante annos aliquot, sub nomine *Pipsisseva*, frequentissime ad Febres intermittentes exhibebatur in Pensylvania.

150. PYROLA *uniflora*, scapo unifloro. *Linn. Sp. pl. 568. Mat. med. 315.*

LOC. Americae borealis sylvae. *Perennis.*

PHARM. *Pyrolae uniflorae* Herba.

QUAL.

QVAL. styptica.

VIS: adstringens.

VSVS: Ophthalmia.

Styracem officinalem, in hortis Carolinianis hospitari, mihi narratum est.

DIGYNIA.

151. CHRYSOSPLENIVM *oppositifolium*. L.

Sp. pl. 569.

LOC. Canadae — Noveboraci loca umbrosa humida. *Annua.*

PHARM. *Chrysofplenii oppositifolii* (et alternifolii) Herba.

QVAL. succulenta, acris, substyptica.

VIS: aperiens, leniter roborans.

VSVS: Tussis, Asthma, Infarctus abdominales.

152. SAPONARIA *officinalis*, calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. Linn. Sp. pl.

584. Mat. med. 320. Gr. virg. 160. ed. n. 68.

LOC. Virginia. *Perennis.*

PHARM. *Saponariae* Radix, Herba, Semina.

QVAL. amara, trita spumescens. *Exoleta.*

VIS: pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Cachexia, Leucorrhoea, Icterus, Ascrides.

DIANTHVS *Caryophyllus*, floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. Linn. Sp. pl. 587.

LOC. Hospitans in hortis. *Perennis, cicur.*

PHARM. *Tunicæ* Flores, (Corolla) Conserva,
Syrupus, Aqua, Acetum.

QVAL. fragrans. *Trita, praeftans.*

VIS: cordialis, sudorifera, alexiteria.

VSVS: Contagium, Exanthemata, Febres.

COMP. Spir. Embryon. — Potiones cordiales.

PENTAGYNIA.

353. OXALIS *violacea*, scapo umbellifero, foliis ternatis obcordatis, calycibus apice callosis. *Linn. Sp. pl. 621. Gr. virg. 161. ed. n. 72.*

LOC. Canada — Florida.

OXALIS *stricta*, caule ramoso erecto, pedunculis umbelliferis. *Linn. Sp. pl. 624. Gr. virg. 161. ed. n. 71.*

LOC. Nova-Anglia — Virginia.

PHARM. *Acetosellæ* Herba, Conserva, Syrupus, Sal Essentiale.

QVAL. acida.

VIS: refrigerans, attenuans.

VSVS: Febres putridæ, phlogisticæ.

COMP. Iulep. antifebr. Acetum.

SVRIANA *maritima*. *Linn. Sp. pl. 624. — Bay - Cedar.*

LOC. Bahama.

Cortex mucilaginosus ad Fissuras labiorum sanandas applicatur.

DECAGYNIA.

154. PHYTOLACCA *decandra*, floribus decandris decagynis. Linn. Sp. pl. 631. Amoen. acad. 4. pag. 523. Gr. virg. 161. ed. n. 72. Cold. noveb. 251. — Pokeweed. Cancer-root.

Loc. Nova-Anglia — Georgia. Perennis.

PHARM. *Phytolaccae* Herba recens, Succus, Radix, Baccae.

Loc. tenellae aquosa, oleracea; adultae acris. vis: corrodens; anodyna, drastica. Succu fol.


adult. expressi Cochl. 1 - 2. *Eximia, rarior.*

vsus: Carcinoma! tinctorius. Rad. et Baccae.

Poke vulgo, cuius succus sole inspissatus in ulceribus sinuosis callosis egregia praestat, ac repetitis experimentis canculos genuinos curavit. *Colden.*

Radicis Extr. in ulceribus mali moris, labiorum et mammarum, cancro similibus; externe et interne. Rodendo agit.





CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

155. ASARVM *canadense* foliis reniformibus mucronatis. *Linn. Sp. pl.* 633. *Gr. virg.* 52. *ed. nov.* 72. *Cold. noveb.* 110. *Mill. dict. n.* 2. t. 53. f. 2.

LOC. Canadae — Virginiae nemora. *Biennis.*

ASARVM *virginicum* foliis cordatis obtusis glabris petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 633. *Gr. virg.* 162. *ed. nov.* 72. *Mill. dict. n.* 3. — *Wild Ginger. Coltsfoot. (falso)*

LOC. Terra Mariana — Carolina. *Biennis.*

PHARM. *Asari Radix.* 3j. Extract. ʒj. fol. no. vj.

QUAL. amaro-acris, nauseosa, aromatica, calida, non ingrata. Semina acria, calida.

Trita, heroica.

VIS: vomitoria! purgans! diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.

VSVS: Melancholia, Coryza.

Zingiberis sylvestris nomen huic radici haud inapte convenit, zingiberis enim sapore, licet debiliore, radix recens praedita est. — Infusum vinosum vel spirituosum in relaxatione cachectica, post febres intermittentes utile; vel folia nr. iv — xii cum frustulo Cinnamomi per noctem unam digesta. Sed virtutes radicis in variis regionibus, non semper aequales. Aceto infusa radix, vim emeticam perdit.

Asa-

Afarum virginicum olim pro *Serpentar. virginica* in Anglia vendebatur. Carolinianis *Heart-Snake Root* audit; ad Cardialgiam praecipue laudatur; ceterum viribus cum canadensi conveniens. Huius radicem cum axungia porcina in unguentum digestam ad gangraenam adhibent Indigenae. Folia in axungia porcina leniter cocta in ambustis egregii usus. *Clayt.*

Afari canadensis radices suaveolentes in petio vino fermentanti immerfae, liquorem gratiorem reddunt. *Cornut.*

156. WINTERANIA *Canella*. *Linn. Sp. pl.* 636. *Mat. med.* 327.

Arbor baccifera laurifolia aromatica. *Catesb.*
Carol. 2. p. 50. t. 50.

LOC. Carolina? — Bahama.

PHARM. *Canellae albae* Cortex.

QUAL. acris, pungens, subamara, aromatica, fragrans. *Rarior, praestans.*

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.

VSVS: Catarrhus, Haemorrhagia! Paralysis linguae.

157. PORTULACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 638. *Mat. med.* 328. *Gr. virg.* 59. *ed. n.* 73. *Cold. noveb.* 128. *Mill. dict.* 1.

LOC. Noveboracum — Virginia. *Anmia.*

PHARM. *Portulacae* Herba, Conserva, Syrupus, Aqua.

QUAL. aquosa. *Culinaris, superflua.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.

VSVS: Nausea; Scorbutus, Stranguria, Calculus.

DIGYNIA.

158. *AGRIMONIA Eupatoria*, foliis caulinis pinnatis impari-petiolatis, fructibus hispidis. *Linn. Sp. pl.* 643. *Mat. med.* 330. *Amoen. acad.* 4. p. 533. *Gr. virg.* 53. ed. n. 74.
 LOC. Noveboraci — Virginiae prata. *Perennis*.
 PHARM. *Agrimoniae* Herba, Aqua.
 QVAL. styptica.
 VIS: adstringens, roborans, pellens, diuretica, vulneraria.
 VSVS: Febres calidae. Rd. infus.

TRIGYNIA.

159. *EUPHORBIA maculata*, dichotoma, foliis ferratis oblongis pilosis, floribus axillaribus solitariis, ramis patulis. *Linn. Sp. pl.* 652.
 LOC. Novae Anglia — Carolinae, arenosa.
Annua.
 QVAL. lactescens, acris.
 VSVS: ad Clavos et Verrucas a nonnullis adhibetur.
160. *EUPHORBIA Ipecacuanhae*, dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto. *Linn. Sp. pl.* 653. *Amoenit. acad.* 3. p. 117. *Gr. virg.* 58. ed. n. 75.
 LOC. Canada, Virginia.
Ipecacuanha. A nonnullis, praecipue incolis Borealibus temere ad vomitum ciendum interne usurpatur. *Clayt*.

161. EUPHORBIA *portulacoides*, dichotoma, foliis integerrimis ovalibus retusis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto. *Linn. Spec. pl.* 653. *Amoen. acad.* 3. p. 117. *descr.* — Purge-root Terrae Marianae Incolis.

Loc. Noveboracum — Marylandiae ficca.

vis: purgans. Radicis recentis 3j et ultra comedunt.





CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

162. CACTVS *Opuntia* articulato - prolifer laxus, articulis ovatis, spinis setaceis. *Linn. Sp. pl.* 669. *Gr. virg.* 54. *ed. nov.* 75. — *Prikly-pear.*

LOC. Noveboracum — Carolina. *Perennis.*

PHARM *Opuntia.*

QUAL. succulenta. Lotium rubrum, ab esu fructuum.

VIS: emolliens, antiphlogistica, maturans.

VSVS: Articuli fissi, leniter tosti ad Ulcera chronica. Arthritis inflammatoria, Rheumatismus.

Psidium pyriferum. *Linn. Sp. pl.* 672. — *Guava.*

LOC. Bahama. Fructus dulcis. — Folia ad fissuras labiorum et mammarum applicantur.

MYRTVS *communis* floribus solitariis, involucro diphylló. *Linn. Sp. pl.* 673. *Mat. med.* 235.

LOC. Virginia. (hospitans.) *Arbor.*

PHARM. *Myrti* Folia, Baccæ, Oleum.

QUAL. substyptica, aromatica, fragrans. *Rarior.*

VIS: calefaciens, corroborans, adstringens.

VSVS: Profluvia.

PVNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Linn. Sp. pl.* 676. *Mat. med.* 338.

LOC. Carolina — Florida. *Arbor, mansueta.*

PHARM.

PHARM. *Balaustiorum Flores.*

Malicorium.

Granatorum Semina, Syrupus.

QUAL. styptica, rubra. *Trita, praestans.*

VIS: adstringens, laxans, anodyna fl.; pellens, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Cephalalgia, Prolapsus.

COMP. Troch. Carabe, Pulv. dysentericus, Gargarismata.

163. AMYGDALVS *Perfica*, foliorum ferraturis omnibus acutis, floribus sessilibus solitariis. *Linn. Sp. pl. 676. Mat. med. 338.*

LOC. Canada — Florida. — (Indigena nonnullis creditur.) *Arbor, frequens.*

PHARM. *Perficae Flores, Syrupus, Nuclei, Aqua.*

QUAL. amara.

VIS: anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Vermes, Colica, Ebrietas, Calculus, Tympanitis.

Amygdalus communis - rarior - in hortis aliquibus.

164. PRVNVS *virginiana* floribus racemosis, foliis deciduis basi antice glandulosis. *Linn. Sp. pl. 677.*

Cerasus sylvestris. Gron. virg. 54. ed. n. 75.

Cold. noveb. Cat. Carol. I. t. 28. pag. 28? —

Wild Cherry, Black Cherry.

LOC. Novanglia — Georgia. *Arbor, frequens.*

PHARM. *Cerasi sylvestris Fructus, Nuclei, Folia. Gummi.*

QUAL. amara, acida. Sem. oleosa.

VIS:

vis: Folia viridia, venenata, bobus saltem, dicuntur; sicca non ita.

vsus: fruct. diaeteticus; infusum spirituosum; Emulsio. Sem. decortic.

165. PRVNVS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis.

Linn. Sp. pl. 679. *Mat. med.* 342.

LOC. Americae horti. *Arbor, frequens.*

PHARM. *Cerasorum rubrorum* Fructus, Rob, Con- dita, Nuclei, Gummi.

QUAL. aquosa, acidiuscula, sapida.

Culinaris, usitata.

vis: refrigerans.

vsus: Febres.

166. PRVNVS *sylvestris*, fructu rubido, acido- dulci?

Prunus sylvestr. humilior, fructu rubro prae- cociori et minori, radice reptatrice. *Gr. virg. ed. n. 76.* — *Indian Plumbs. Cherokee-plumbs. Swamp-plumb-tree.*

LOC. Noveboraci — Georgiae, arenosa, sicca et humida. --

Ligni Cineres Indigenae cum Axungia Ursi in Vnguentum redigunt, eoque Hydropicos illi niunt.

Prunus domestica - rarior adhuc in America.

DIGYNIA.

167. CRATAEGVS *coccinea* foliis ovatis re- pando-angulatis ferratis glabris. *Linn. Sp. pl.* 682. *Gr. virg.* 54. *ed. n. 76.* *Cold. noveb. Mill. dict. t. 179.* — *Cock-spur Hawthorn.*

CRA-

CRATAEGVS *Crus Galli*, foliis lanceolato-ovatis glabris ramis spinosis. *Linn. Sp. pl.* 682. Fructu majore *Gr. virg. ed. nov.* 76. *Mill. dict. t.* 178. *f.* 2. *Kalm. it. I.* p. 244.

LOC. Novanglia — Carolina. Georgia.

PHARM. *Crataegi* Baccae. (rubrae.)

QUAL. farinosa, succoso-subfatua; regionibus australioribus dulcescens.

VIS:

VSVS:

CRATAEGVS *tomentosa*, foliis cuneiformi-ovatis ferratis subangulatis, subtus villosis, ramis spinosis. *Linn. Sp. pl.* 682. *Gr. virg.* 55. *ed. n.* 76.

LOC. praecedentis.

Currants. Pomis parvis rubentibus dulcibus.

Syrupus ex Baccis contusis, Saccharo coctis.

SESVVIVM *Portulacastrum.* *Linn. Sp. pl.* 684. — *Sea-pursley.*

LOC. Floridae australioris, Bahamae maritima. *Annua.*

Succulenta. In India Orientali inter obsonia et acetaria recipitur.

PENTAGYNIA.

168. **PYRVS** *Malus* foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 686. *Mat. med.* 349.

LOC. Americae Pomaria. *Arbor, frequens.*

PHARM. *Pomorum* Succus liquidus.

QUAL. acidula, esculenta, liquida.

VIS: refrigerans, tonica, subeccoprotica.

VSVS: Febres.

169. PY-

169. PYRVS *Cydonia foliis integerrimis, floribus solitariis.* Linn. Sp. pl. 687. Mat. med. 350.
 LOC. Americae Pomaria. Arbor, frequens.
 PHARM. *Cydoniae Fructus*, Condita, Rob, Syrupus, Succus, Mica, Panis, Cortex, Semina, Oleum.
 QVAL. acido-styptica. Sem. mucilaginosi. Trita, praestans.
 VIS: adstringens, refrigerans. Sem. inviscans.
 VSVS: Nausea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhoea, Abortus.
 COMP. Aqua Cinnamomi cydoniata.

170. SPIRAEA *trifoliata* foliis ternatis serratis subaequalibus, floribus subpaniculatis. Linn. Sp. pl. 702. Amoen. acad. 4. p. 523. Gr. virg. ed. n. 77. Cold. noveb. 117. Mill. dict. n. 7. — *Ipecacuanha*, Indian physic. Beaumont-root.
 LOC. Canada — Virginia. Frutex.
 PHARM. *Spiraeae trifoliatæ Radix*.
 QVAL.
 VIS: Emetica purgans. dos. ℥j - ʒj. aequè tuto operantur ac unquam *Ipecacuanha*.
 VSVS:

POLYGYNIA.

171. ROSA *Carolina* germinibus globosis hispidis, pedunculis subhispidis, caule aculeis stipularibus, petiolis aculeatis. Linn. Sp. pl. 703.
 Rosa canina sylvestris inodora. Gr. virg. ed. n. 78? 77? Cold. noveb.
 LOC. Novae-Angliae — Carolinae paludosa.
 Frutex.
 PHARM.

PHARM. *Rosae Carolinae* Fructus - - Flores. —
Bedeguar fung.

QVAL.

VIS: subadstringens, roborans.

172. *ROSA Canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.

Linn. Sp. pl. 704. *Mat. med.* 355.

Rosa sylvestris folis odoratis, Sweet Briar. *Gr. virg. ed. n.* 78.

LOC. *Novae Angliae* — *Virginiae*, sicca, sylvatica.

PHARM. *Rosae sylvestris*, Flores, ▽, pallidum Conserva.

Cynosbati Fructus, Semina.

Bedeguar Fungus (nidus infecti).

QVAL. fragrans, pallida, spirituosissima.

Trita, praestans.

VIS: eccoprotica. Bedeguar adstringens.

VSVS: Soda, *Cynosb.*

COMP. Syrupus rosarum solutivus. ʒj. Mel rosarum.

173. *RVBVS fruticosus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 707. *Gr. virg.* 163. *ed. n.* 78. — *Blackberry.*

LOC. *Nova - Anglia* — *Virginia.*

Frutex.

RVBVS occidentalis foliis ternatis subtus tomentosis, caule aculeato, petiolis teretibus.

Linn. Sp. pl. 707. *Kalm. it.* 2. p. 283.

LOC. *Canada* — *Pensylvania.*

Frutex.

PHARM. *Rubi* (Fructuum) Syrupus, ▽, Acetum, Ω. —

Schoepfi Mat. med.

F

QVAL.

QUAL. acidula, grata. Rad. adstringens.

Trita, praestans.

VIS: refrigerans, analeptica.

VSVS: Sitis, Febrium aestus. Rubi occid. Radix, una cum Lobelia decoquitur, et in Lue venerea exhibetur.

174. RVBVS *arcticus*, foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Linn. Sp. pl.* 708. *Mat. med.* 358.

LOC. Canada.

Perennis.

PHARM. *Norlandicarum baccarum* Condita.

QUAL. acidula, fragrans.

Rarior, eximia.

VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!

VSVS: Febres putridae, exanthematicae, Scorbutus!

175. RVBVS *Chamaemorus* foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Linn. Sp. pl.* 708. *Mat. med.* 359. *Gr. virg. ed. n.* 78.

LOC. Virginiae montes, ad ripas fluviorum.

Perennis.

PHARM. *Chamaemori* Condita.

QUAL. aquosa, inodora, esculenta.

Rarior, praestans.

VIS: diluens, humectans, refrigerans.

VSVS: Haemoptysis, Phthisis, Scorbutus.

176. FRAGARIA *vesca*, flagellis reptans. *Linn. Sp. pl.* 709. *Mat. med.* 360. *Gr. virg.* 56. *ed. nov.* 78. *Cold. noveb.* — Strawberries.

LOC. Novae-Angliae — Virgin. sylvae. *Perennis.*

PHARM. *Fragariae* Herba. (Fructuum) Syrupus, ∇ , Acetum, \sqcup .

QUAL.

QVAL. aquosa, acida, fragrans. *Trita, praeſtans.*
VIS: diluens, humectans, subrefrigerans, dia-
phoretica, diuretica, eccoprotica.

VSVS: Calculus, Febres, Podagra! Phthiſis.

177. *POTENTILLA fruticoſa*, foliis pinnatis,
caule frutiçoſo. *Linn. Sp. pl. 709. Kalm.*
it. 2. p. 263. Gr. virg. ed. n. 79.

POTENTILLA reptans foliis quinatis, caule
repente, pedunculis unifloris. *Linn. Sp. pl.*
715. Mat. med. 362. Gr. virg. 163. ed. n. 79.

POTENTILLA canadensis foliis quinatis vil-
loſis, caule adſcendente hiriſuto. *Linn. Sp.*
pl. 713.

LOC. Canada — Virginia. — *Perennes, biennes.*

PHARM. *Pentaphylli Radix, Herba.*

QVAL. ſtyptica.

VIS: vulneraria, adſtringens.

VSVS: Dyſenteria. Viſcerum debilitas, Hae-
morrhagia.

COMP. Gargarifmata.

178. *GEVM virginianum*, floribus erectis, fructu
globoſo; ariſtis uncinatis nudis, foliis ter-
natis. *Linn. Sp. pl. 716. Gr. virg. 56. ed.*
nov. 79.

LOC. Nova-Anglia — Virginia. *Biennis.*

PHARM. *Gei Radix.*

QVAL. ſtyptica, inodora.

VIS: adſtringens.

VSVS: Febres intermittentes.

179. CALYCANTHVS *floridus*, petalis interioribus longioribus. Linn. Sp. pl. 718. Mill. dict. ic. t. 60. — Carolina Allspice.


Frutex corni foliis. Cat. Carol. I. p. 46. t. 46.


Loc. Carolina.

Frutex.

PHARM. *Calycanthi* Cortex.

QUAL. aromatica; Cinnamomi Odore et Sapore debiliore.





CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

180. *ACTAEA racemosa*, racemis longissimis, fructibus siccis. *Linn. Sp. pl.* 722. *Amoen. acad.* 4. pag. 522. *Mat. med.* 367. *Gr. virg.* 59. ed. n. 79. *Cold. noveb.* 125. *Act. Lond.* Vol. 20. n. 246. pl. 41. — *Squab-root. High-rattle-Snake-root.* — *Richweed. Black-Snake-root.*

LOC. Canada — Florida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. *Actaeae Radix, Essentia.*

QUAL. tetra, foetida, subvenenata. Rad. Hba et Flor. *Cauta, heroica.*

VIS: pellens, fudorifera, anodyna, repellens, diuretica.

VSVS: Asthenia virginica. Rheumatismus, Rad. decoct. Vapor. Radic. huius, cum Sanguinariae, ana decoct. saturat. ℥j. Equis exhibetur, scopo purgandi, vermes evacuandi, appetitum ciendi.

181. *ACTAEA spicata* racemo ovato, fructibus baccatis. *Linn. Sp. pl.* 722. *Mat. med.* 367. *Mill. dict. n.* 2. *Corn. Canad. t.* 77.

LOC. Canadae — Pennsylvaniae nemora.

QUAL. VIS: VSVS: praecedentis.

182. *SANGVINARIA canadensis.* *Linn. Sp. pl.* 723. *Amoen. acad.* 4. p. 515. *Gr. virg.* 57. ed.

ed. nov. 80 Cold. noveb. 126. Corn. canad. 212.

— *Blood-root. Puccoon. Turmerick* nonnullis.

LOC. Canadae — Virginiae Nemora, *Biennis.*

PHARM. *Sanguinariae Radix.*

QUAL. Succus saturate aureus, acris corrodens.
Flavo tingit; Spirit. Vini Colore rubro grato inficit.

VIS: emetica, purgans.

VSVS: Rad. decoct. tenue Gonorrhoea; Morfura Serpentum; Morbi biliosi; — Succ. Verrucae. Icterus, rad. pulv. 3j. in Cerevisia.

183. *PODOPHYLLUM peltatum*, foliis peltatis palmatis. *Linn. Sp. pl.* 723. *Gr. virg.* 57. ed. n. 81. — *May-Apple. Ipecacuanha*, in Carolina.

Anapodophyllon canadense. *Cat. Car.* 1. p. 24.

LOC. Canadae — Carolinae paludosa. *Perenne.*

PHARM. *Podophylli Radix, Fructus.*

QUAL. Fr. acido-dulcis, edulis, (Columbae carolinae eo faginantur),

VIS; Rad. emetica,

VSVS;

184. *CHELIDONIVM majus* pedunculis umbellatis. *Linn. Sp. pl.* 723. *Mat. med.* 368. — *Celandine.*

LOC. Noveboraci rudrata.

PHARM. *Chelidonii majoris Radix, Herba, Aqua.*

QUAL. succus luteus, amarus, acris, deurens.
Karior, praestans.

VIS: diuretica, diaphoretica.

VSVS: Icterus, Cachexia, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium.

185. CHELIDONIVM *Glaucium* pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabrō. *Linn. Sp. pl.* 724. *Gr. virg.* 57. ed. nov. 79. *Mill. dict. n.* 3. — *Horned Poppy.*
Bruiſe-root.

LOC. Virginiae arenosa, maritima. *Annua.*

PHARM. *Glaucii* Radix, Folia.

QUAL. succus luteus, amarus, acris, foetidus.

VIS: venenosa, phantastica, stupefaciens. *Lowthorp. Transact. abridgd.* 2. p. 642.

VSVS: Contusiones, Vulnere, interne et externe, in Cornubia; Calculus, Folia contusa vino albo macerata, in Portugallia, *Tournefort.* Ulcera Equorum, Folia, in Gallo-Provincia; *Garidell.*

186. ARGEMONE *mexicana* capsulis quinquevalvibus, foliis spinosis. *Linn. Sp. pl.* 727. *Mill. dict. ic. t.* 50. — *Prickly Poppy.*

LOC. Mexico, Bahama; horti Americani. —

Annua, biennis.

PHARM. *Papaveris spinosi* Herba, Semina.

QUAL. Succus luteus inspissatus Gummi guttae similis, flavo tingens.

VIS: anodyna, hypnotica. Sem. drastica.

VSVS:

187. NYMPHAEA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Linn. Sp. pl.* 729. *Mat. med.* 372. *Gron. virg. ed. n.* 81.

LOC. Americae stagna fluviique. *Perennis.*

PHARM. *Nymphaeae albae* Radix, Flores, Conferva, Syrupus, ∇, ⊙.

QUAL. Fl. fragrans. Rad. acris, saponacea; subdulcis, adstringens.

vis: Fl. refrigerans, anodyna, hypnotica. Rad. vesicatoria.

vsvs: Diarrhoea, Gonorrhoea, Febres.

188. NYMPHAEA *Nelumbo*, foliis peltatis undique integris. *Linn. Sp. pl.* 730.

LOC. Pensylvania. *Perennis.*

PHARM. *Nelumbo* (*Fabae Aegyptiacae*) Flores, Semina, Radix.

QUAL. florum fragrantissima.

Radices coctae vel tostae, eduntur; Cynaras sapore referunt. *Rumph.* Semina immatura cruda Avellanas sapore aemulantur; matura autem Castaneas; et tunc antea vel coqui vel alio modo praeparari debent. Ex Seminibus immaturis decorticatis Chineses una cum Saccharo et Aqua pulpam praeparant, refrigerantem, analepticam, convalescentibus utilem. Petioli quoque et folia juniora edulia sunt.

BIXA *Orleana*. *Linn. Sp. pl.* 730. *Mat. med.* 373.

LOC. Mexico.

PHARM. *Orleana* Terra (faeculae).

QUAL. subamara, subaromatica, rubra.

vis: tinctoria, refrigerans, corroborans, stomachica.

vsvs: Haemorrhagia, Profluvia.

comp. Chocolata, Bezetta.

MAMMEA *americana*. *Linn. Sp. pl.* 731.

LOC. Bahama, e Cuba allata.

Fructus gratissimus, saccharo conditus confortans. Seminum cortex et pulpa amarissima.

Jacq.

189. TL

189. *TILIA americana*, floribus nectario instructis. *Linn. Sp. pl.* 733. *Gr. virg.* 58. *ed. n.* 82. *Mill. dict. nr.* 4.

LOC. Canada — Virginia.

Arbor.

PHARM. *Tiliae* Carbo, Cortex interior, Flores.

QVAL. flor. minus fragrantiores quam Europaeae.

VIS:

VSVS: Carbonum pro pulv. sclopetario.

Thea Bohea — laete crescit in hortis nonnullis Virginiae.

TRIGYNIA.

190. *ACONITUM Napellus* foliorum laciniis linearibus superne latioribus: linea exaratis. *Linn. Sp. pl.* 751. *Mat. med.* 381. *Gr. virg.* 165. *ed. n.* 82. *Mill. n.* 5. — *Wolfsbane.*

LOC. Virginiae humida.

Perennis.

PHARM. *Napelli* Herba, Extract. gr. β ad j.

QVAL. substyptica, acris, nauseosa, toxica.

Heroica.

VIS: corrodens, vesicans, excorians, vomitoria, draastica, convulsiva, vertiginosa, sternutatoria, pellens, sudorifera.

VSVS: Febres intermittentes, Ischias, Arthritis, Rheumatismus, Scirrhus, Anchylosis.

191. *DELPHINIVM Staphisagria* nectariis diphyllis petalo brevioribus; foliis palmatis: lobis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 750. *Mat. med.* 380. *Gron. virg. ed. n.* 82.

LOC. Virginia.

Biennis.

PHARM. *Staphisagriae* Semina.

QVAL. amara, nauseosa. *Trita, praestans, externa.*

vis: draſtica, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.

vsvs: Pediculi, Acari ſubcutanei, Odontalgia.

PENTAGYNIA.

192. FIBRA aurea. Cold. Filiae. — Gold-threat.
Loc. Noveboraci humida.

Radix et folia amara. — Decoct, ad ulcera aphthoſa.

POLYGYNIA.

193. LIRIODENDRON Tulipifera. Linn. Sp. pl. 755. Amoen. acad. 4. p. 517. Gr. virg. 60. ed. n. 83. Cold. noveb. 130. Cat. Carol. 1. p. 48. t. 48. Kalm. it. 2. p. 322. — Poplar, White-wood, Canoe-wood-tree, Knutree, Tuliptree. Tulipier, Bois-jaune. Tolpen-boom.

Loc. Nova-Anglia — Florida. Arbor.

PHARM. Liriodendri Radix, Cortex, Semina.

QUAL. Rad. flaveſcens, acriuſcula, fragilis.

vis: Rad. febrifuga; Cort. anthelminthica; Sem. aperientia.

vsvs: Cort. radicis ſpiritu vini infuſus: Febres intermittentes, Rheumatismus, Arthritis.

Folia contuſa indigenae fronti Cephalalgiae medendi cauſa imponunt — Unguentum e gemmis ad Inflammationem et Gangraenam.

194. MA-

192. Rad. repens, aurea. Fol. radicalia ternata, ſubrotunda, crenata. Scapus uniſlorus, quadripollicaris. Cal. 6. Cor. 6-petala, alba, extus rubeſcens. Neſſaria 3-6. compreſſa pedicellata. Stam. plurima. Piſt. 5. Styli ſolitarii inflexi. Brigmata biſida. Capsulae 5 pedicellatae, Sem. 8-10. — Ita Coldenia. Mihi planta ignota eſt.

194. *MAGNOLIA glauca*, foliis ovato-oblongis, subtus glaucis. *Linn. Sp. pl.* 755. *Gr. virg.* 61. *ed. n.* 83. *Cat. Carol.* 1. p. 39. t. 39. *Kalm. it.* 2. 324. — Sweet-flowering Bay, Beaver-tree, Swamp-Sassafras.

LOC. Noveboracum — Florida. *Arbor.*

PHARM. *Magnoliae glaucae* Cortex, Semina, Carbones.

QUAL. amaro-aromatica.

VIS: subadstringens, tonica, antifebrilis. Sem. stomachica, pectoralis.

VSVS: Decoct. Cort. Diarrhoea, Tussis, Phthisis, Febres, Haemorrhoids, Aestus febrilis, Dolores interni; — Decoct. ramor. junior. Catarrhus, Coryza. Semina: Tussis et alii morbi pectoris. Carbonum Unguent. cum Axungia porcin. Ulcera.

COMP. Sem. infusum spirituofum.

195. *MAGNOLIA acuminata*, foliis ovato-oblongis acuminatis. *Linn. Sp. pl.* 756. *Gr. virg.* 61. *ed. nov.* 83. *Kalm. it.* 2. pag. 424. *Cat. Carol.* 3. p. 15. t. 15. *Mill. dict. n.* 4.

LOC. Pennsylvaniae — Carolinae Montes. *Arbor.*

PHARM. *Magnoliae acuminatae* Cortex, Semina, Pericarpia.

QUAL. praecedent. — Fr. magis amaro-aromatica.

VIS: praeced.

VSVS: praeced.

196. *ILLICIVM floridanum* floribus rubris. *L. Syst. veg.* p. 422. *Ellis act. angl.* 1770, Vol. LX. p. 524. t. 12.

LOC. Florida.

Arbor.

PHARM. *Anisi stellati (floridani)* Fructus, Essentia.

QVAL. fragrans.

VIS:

VSVS:

Flores odore debili; fructus viribus debiliores, quam Illic. anisatum.

197. ANNONA *glabra?* — Folia oblongo-lanceolata, fructus ovatus glaber lutescens; Cortex glaber. — *Papaw.*

LOC. Pennsylvaniae pinguis humida.

Arbor.

PHARM. *Annonae* fructus, Cortex?

QVAL. Cortex et Folia odore tetro, foetido, Daturae simili. Fructus esculenti, acidodulces, subgrati. Cortex fructuum sapore ingrato, terebinthinaceo.

VIS:

VSVS: Vinum e fructibus immaturis a nonnullis praeparatur, diaphanum, coloris fere expers, et ad Aphthas Infantum laudatum.

198. ANEMONE *Hepatica*, foliis trilobis integerrimis. *Linn. Sp. pl. 758. Mat. med. 388. Gr. virg. 61. ed. n. 84. — Noble Liverwort.*

LOC. Canadae — Virginiae nemora. *Perennis.*

PHARM. *Hepaticae nobilis* Herba, Flores.

QVAL. inodora, insipida.

Exoleta, praestans. Fl. superflua.

VIS: adstringens, tonica.

VSVS: Hypochondriasis, Hernia.

199. ANEMONE *virginica*, pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, feminibus hirsutis

197. Cum *Annona muricata* *Gron. virg. 61.* fructus non convenit.

hirsutis muticis. *Linn. Sp. pl.* 761. *Gr. virg.* 165. *ed. n.* 84.

LOC. Rhode-Island — Virginia. *Perennis.*

VSVS: Semina cum pappo villoso Spiritu Vini imbuta ad Odontalgiam. *Kalm. it.* 2. 279.

200. THALICTRUM *purpurascens?* — Meadow-Rue, a nonnullis Cerevisiae, quae ex Pino Balfamea conficitur (Spruce beer) additur. *Thalictrum* Cornuti — ad morsuras serpentum prodesse dicitur.

201. RANUNCULUS *abortivus*, foliis radicalibus cordatis crenatis, caulinis ternatis angulatis, caule subtrifloro. *Linn. Sp. pl.* 776. *Gr. virg.* 166. *ed. n.* 86.

LOC. Canadae — Virginiae palustria.

VSVS: Syphilis, una cum Lobeliae radice; diaphoretica dicitur.

202. RANUNCULUS *sceleratus*, foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *Linn. Sp. pl.* 776. *Gr. virg.* 63. *ed. nov.* 85.

LOC. Noveboraci — Virginiae palustria, humida nemorosa.

PHARM.

QUAL. Rad. urens, acerrima.

VIS: corrodens.

VSVS: Ulcera chronica.

203. HELLEBORUS *foetidus*, caule multifloro folioso, foliis pedatis. *Linn. Sp. pl.* 784. *Mat. med.* 394. *Gr. virg. ed.* 87.

LOC. Virginia.

PHARM.

PHARM. *Hellebori foetidi* Herba.

QVAL. acris, tetra.

VIS: purgans, emetica, anthelminthica.

VSVS: Ad Lumbricos extirpandos a nonnullis
fatis audacter teneris infantibus exhibetur.
Pulvere foliorum puerorum pediculos ene-
cant Indigenae. *Clayt. n. 323.*

HELLEBORVS ^{*trifolius*} ~~*viridis*~~ scapo unifloro, foliis
ternatis. *Linn. Sp. pl. 784. Kalm. it. 3. p. 379.*
Loc. Canadae Pensylvan. sylvae nemorosae.


VSVS: Folia et caules colore flavo tingunt.
Radix et herba in Equorum morbis praestat.

CALTHA *palustris*. *Linn. Sp. pl. 784. Gr.*
virg. 166. ed. n. 87.

Loc. Canadae — Virginiae humida.

QVAL. acris. — Pecoribus intacta remanet.





CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMA.

204. TEVCRIVM *Chamaepitys*, foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *Linn. Sp. pl.* 787. *Mat. med.* 396. *Gr. virg.* 64. ed. nov. 87.

LOC. Virginia.

Annua.

PHARM. *Chamaepityos* herba.

QUAL. resinoso-aromatica, amara.

Trita, praestans.

VIS: tonica, stomachica, resolvens, pellens, emmenagoga.

VSVS: Rheumatismus, Arthritis, Podagra, Haematuria?

205. TEVCRIVM *canadense*, foliis ovato-lanceolatis serratis, caule erecto, racemo terminali, verticillis hexaphyllis. *Linn. Sp. pl.* 789. *Gr. virg.* 64. ed. n. 87.

LOC. Canada — Virginia.

Biennis.

QUAL. folia odore Allii praedita.

VSVS: Scordii.

206. NEPETA *Cataria* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis. *Linn. Sp. pl.* 796. *Mat. med.* 404. *Gr. virg. ed. n.* 89.

LOC. Noveboraci — Virginiae rudrata. *Perennis.*

PHARM. *Nepetae* Herba.

QUAL.

QVAL. hircosa felina, amara. *Exoleta, praeftans.*
 VIS: resolvens, pellens, cephalica, emmenago-
 ga, anthelminthica.

VSVS: Hysteria, Chlorosis! Febres.

COMP. Infessus.

207. MENTHA *viridis*, spicis oblongis lanceo-
 latis nudis ferratis sessilibus, staminibus co-
 rolla longioribus. *Linn. Sp. pl. 408. Gr.*
virg. 167. ed. n. 89.

LOC. Virginiae umbrosa humidiora. *Perennis.*

PHARM. *Menthae viridis* Herba.

QVAL. amaricans, spirans.

VIS: resolvens, pellens.

VSVS: Hysteria, Colica, Vomitus.

Viribus convenire dicitur *Mentha viridis*, cum
M. sylvestri, *L. Mat. med. 408.* sed debilior.

208. GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus
 crenatis. *Linn. Sp. pl. 807. — Ground-Ivy.*

LOC. Noveboraci culta. *Perennis.*

PHARM. *Hederae terrestris* Herba, Conserva, Sy-
 rupus, ▽.

QVAL. amaricans, subacris. *Trita, debilis.*

VIS: Tonica, vulneraria.

VSVS: Ulcus internum, Colica hypochondria-
 ca, Tussis, Cephalalgia.

200. MARRUBIUM *vulgare* dentibus calycinis
 fetaceis uncinatis. *Linn. Sp. pl. 816. Mat.*
med. 416. Gr. virg. ed. n. 89. — Hoarbound.

LOC. Novebor. — Virginiae rudrata. *Perennis.*

PHARM. *Marrubii albi* Herba.

QVAL. graveolens, amariuscula, ingrata.

Exoleta, praeftans.

VIS:

vis: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.

vsus: Asthma humorale, Ptyalismus mercurialis, Obstipatio visceris, Dysmenorrhoea, Hysteria.

comp. Syr. Prasii, Pil. agarici; Andromach.

In Morsura Caudifonae, Succu expressi Cochli. j. — ij. vel Marrub. et Plantagin. foliorum ana decoct. saturatius, Caesaris cuiusdam Aethiopis, arcanum, magno premio emtum, est.

210. ORIGANVM *vulgare* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Linn. Sp. pl.* 824. *Mat. med.* 420. *Gr. virg.* 65. *ed. n.* 91.

LOC. Canadae — Virginiae rupestria. *Perennis.*

PHARM. *Origanu vulgaris* Herba.

QUAL. amaricans, subacris, tinctoria, spirans. *Rarior.*

vis: corroborans, abstergens, resolvens, excitans.

vsus: Tussis, Asthma, Phthisis, Chlorosis, Oedema!

comp. Syr. Artemisiae Comp. Balnea uterina. Theae succedanea.

Thymus Serpillum. *L. Mat. med.* 422. In Pennsylvania hinc inde hospitatur.

211. MELISSA *Nepeta* pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule decumbente. *Linn. Sp. pl.* 829.

Calamintha pulegii odore. *Gr. virg.* 65. *ed. n.* 90.

LOC. Virginiae glareosa.

PHARM. *Melissae Nepetae* Herba.

Schoepfii *Mat. med.*

G

QUAL.

QVAL. spirans.

VIS: resolvens, pellens, expectorans. — Vterina est, mensesque pellit. *Clayt.*

Calaminthae Montanae apte substituenda.

212. PRVNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato oblongis ferratis petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 837. *Mat. med.* 429. *Gr. virg. ed. nov.* 91.
 LOC. Noveboraci — Virginiae prata, pascua.
Perennis.

PHARM. *Prunellae* Herba, ▽.

QVAL. subodorata. *Exoleta, superflua.*

VIS: subadstringens. *Vulneraria. Clayt.*

VSVS: Angina.

COMP. Gargarismata.

213. SCUTELLARIA *galericulata* foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Linn. Sp. pl.* 835.

LOC. Noveboraci uda. *Perennis.*

PHARM. *Tertianariae* Herba, succus. *Inusitata.*

QVAL. subodorata, amara.

VIS: abstergens, tonica.

VSVS: Tertianaria.

Scutellariae: lateriflora, integrifolia, hyssopifolia, *Linn. Sp. pl.* 835. *Gron. virg.* 91. viribus cum hac conveniunt.

ANGIOSPERMA.

214. ANTIRRHINUM *Elatine*, foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. *Linn. Sp. pl.* 851. *Gr. virg.* 68. *ed. n.* 94.

Vul-

Vulneraria est. Succus salutaris in vetustis Crurum ulceribus, et in ipsa lepra. *Vogel.*

215. ANTIRRHINUM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Linn. Sp. pl.* 858. *Mat. med.* 432.

LOC. Pennsylvania. *Vulgaris.*

PHARM. *Linariae* Herba.

QUAL. hircofo-urinosa, amariuscula. *Eximia.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, diuretica, purificans.

VSVS: Ophthalmia, Icterus, Varix ani! Hydrops.

COMP. Unguentum *Linariae*.

216. SCROPHULARIA *marilandica* foliis cordatis serratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. *Linn. Sp. pl.* 863. *Gr. virg.* 71. *ed. n.* 95.

LOC. Novae-Angliae – Virginiae prata. *Perennis.*

PHARM. *Scrophulariae* Herba.

QUAL. Folia foetida, amara. — (Odore Sambuci. *Clayt.*)

VIS: Vulneraria (herba recens.)

VSVS:

217. BIGNONIA *Catalpa*, foliis simplicibus cordatis ternis, caule erecto, floribus dian-dris. *Linn. Sp. pl.* 869. *Catesb. Carol.* 1. t. 49. *pag.* 49.

LOC. Noveborac. — Carolina. *Arbor.*

Folia partibus dolentibus imponuntur et nervis perhibentur amica. Siliquarum decoctum propinatur asthmaticis. *Thunberg. flor. Japon.* 251.

218. *BIGNONIA radicans*, foliis pinnatis: foliolis incisis, caule geniculis radicatis. *Linn. Sp. pl.* 871. *Gr. virg.* 73. *ed. n.* 94. *Mill. ic.* t. 65. *Cat. Carol.* 1. p. 65. t. 65. *Corn. canad.* 102. t. 103. — *Poyson - Vine.*
 Loc. Canada? — Terra Mariana — Carolina.
Frutex.

PHARM.

QUAL. dulcescente - acris. fol. —

Plantae succus facultate venenosa praeditus esse fertur. *Clayt.* — Trochilus Colubri, apesque mel e floribus fugunt.

- BIGNONIA crucigera*, foliis conjugatis circrhosis, foliolis cordatis, foliis imis ternatis. *Linn. Sp. pl.* 869. *Gr. virg.* 78. *ed. n.* 95.
 Viribus virulentis, sed deterioribus cum priore convenit. *Clayt.*

- CAPRARIA biflora*, foliis alternis, floribus geminis. *Linn. Sp. pl.* 875.

Loc. Bahama, — Florida australior. *Frutex.*
 Incolae Insular. Caribaear. huius folia veram Theam chinensem praebere contendunt, licet habitu et sapore diversissima; inde nonnullis *Thé du pays* audit. *Iacqu.*

- LANTANA Camara*, foliis oppositis, caule inermi ramoso, floribus capitato - umbellatis aphyllis. *Linn. Sp. pl.* 834. — *Wild - Sage.*

Loc. Bahama.

Foliorum infusum theiforme in Febribus bibitur. Incola insulae minoris bahamensis, loco theae illud forbillans, eo hausto semper nauseabat, a nausea liber quum ab eius usu abstineret.

219. LINNAEA *borealis*. Linn. Sp. pl. 880.

Mat. med. 436. Kalm. it. 2. p. 263.

LOC. Canadæ sylvæ antiquæ. Perennis.

PHARM. *Linnaeae* Herba.

QUAL. sicca (amaricans). Rarior, præstans.

VIS: diluens, diuretica, (subadstringens).

VSVS: Rheumatismus! Scabies!

220. OROBANCHE *virginiana*, caule ramo-
so, corollis quadridentatis. Linn. Sp. pl. 882.

Gr. virg. 168. ed. n. 96. — Cancer-root.

Radix subadstringens ad cancerum laudatur.

Sesamum orientale. Linn. Sp. pl. 883. Mat. med.
437. — Oily grain.

In Florida olim culta. Romans Hist. of Flo-
rida p. 131.

221. VITEX *Agnus Castus*, foliis digitatis ferra-
tis, spicis verticillatis. Linn. Sp. pl. 890.

Mat. med. 438. Gr. virg. 169. ed. n. 97. —

Chaste-tree.


LOC. Virginiae, Carolinae paludosa. Arbor.

PHARM. *Agni Casti* Semina.

QUAL. acris, calida, nidorosa. Exoleta, superflua.

VIS: subadstringens, antivenerea?

VSVS: Hysteria, Gonorrhoea.



CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

222. LEPIDIVM *fativum* floribus tetradynamis,
foliis oblongis multifidis. *Linn. Sp. pl.* 899.
Mat. med. 441. — *Garden-Cress.*
Nasturtium hortense — Colitur.

LEPIDIVM *virginicum*, floribus subtriandris
tetrapetalis, foliis linearibus pinnatis. *Linn.*
Sp. pl. 900. *Gr. virg.* 76. *ed. nov.* 96.

Loc Noveboraci — Virginiae, Iamaicae gla-
reosa. *Annua.*

PHARM. *Nasturtii hortensis*, et *sylvestris* Herba,
Semina.

QUAL. acris, orgastica. *Rarior, praestans.*

VIS: diuretica, mundificans, antiscorbutica.

VSUS: Scorbutus, Hydrops! Asthma, Hernia?
Achor, Calculus.

223. COCHLEARIA *Coronopus* foliis pinnati-
fidis. *Linn. Sp. pl.* 904.

Nasturtium supinum capsulis verrucosis. *Gron.*
virg. 98.

Pertinet inter tonicas et leniter adstringentes
plantas et quae urinam cient. *Vogel.*

COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus
cordato subrotundis, caulinis oblongis. *Linn.*
Sp. pl. 903.

Loc. Horti. —

Annua, cicur.

PHARM.

PHARM. *Cochleariae* Herba, Conserva, Syrupus,
 ∇ , \sqcup , $\circ\circ$, Semina.

QVAL. acris, amara, purgans. *Trita, eximia.*

VIS: diuretica! mundificans, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus! Stromacace, Cachexia, Hydrops, Hypochondriasis.

COMP. Spir. *Cochleariae* purgans.

COCHLEARIA *Armoracia*, foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. *Linn.*

Sp. pl. 904. *Mat. med.* 446. — *Horfe-radish.*

LOC. Horti. *Perennis, vulgarissima.*

PHARM. *Armoraciae* Radix.

QVAL. acris. *Calinaris, trita, eximia.*

VIS: incidens, stimulan, diuretica! cosmetica, mundificans, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus, Anorexia, Cachexia, Hydrops! Calculus, Quartana, Cephalalgia, Arthritis.

224. THLASPI *Bursa pastoris* filiculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Linn. Sp.*

pl. 903. *Mat. med.* 444. *Gr. virg. ed. n.* 98.

LOC. Novae Angliae — Virginiae culta.

Annua, perennis.

PHARM. *Bursae pastoris* Herba.

QVAL. aquosa.

Exoleta, infida.

VIS: subadstringens?

VSVS: Haemorrhagia?

SILIQVOSA.

225. SISYMBRIVM *Nasturtium*, filiquis declinatis foliis pinnatis subcordatis. *Linn. Sp.*

pl. 916. *Mat. med.* 448. *Gr. virg.* 170. *ed. n.* 100.

G 4

LOC.

LOC. Noveboraci — Virginiae rivuli et fontes.

Perennis.

PHARM. *Nasturtii aquatici* herba, Succus $\frac{3}{4}$ v,
Conferva, Syrupus, ∇ , Ω .

QVAL. acris, orgastica. *Trita, eximia.*

VIS: diuretica, antiscorbutica.

VSVS: Scorbutus! Obstipatio, Polypus.

226. SISYMBRIVM *Sophia* petalis calyce minoribus. *Linn. Sp. pl.* 920. *Mat. med.* 449.
Gr. virg. ed. n. 100.

LOC. Virginia.

Annua.

PHARM. *Sophiae* Semina.

QVAL. acris, fervida.

Exoleta.

VIS: adstringens, anthelminthica.

VSVS: Diarrhoea, Hysteria, Calculus.

227. ERYSIMVM *officinale* filiquis spicae appressis, foliis runcinatis. *Linn. Sp. pl.* 922. *Mat. med.* 450. *Gr. virg. ed. nov.* 100.

LOC. Noveboraci — Virginiae rudrata. *Annua.*

PHARM. *Erysimi* Herba.

QVAL. acris.

VIS: abstergens, diuretica.

VSVS: Asthma, Raucedo, Tussis, Ischuria.

COMP. Syrupus *Erysimi*.

BRASSICA *Rapa* radice caulescente orbiculari depressa carnosa. *Linn. Sp. pl.* 931. *Mat. med.* 454. — *Turnips.*

LOC. Colitur in hortis et campis.

PHARM. *Rapae* Semen, Radix, Syrupus:

QVAL. aquosa, esculenta. *Culinaris, eximia.*

VIS: diluens, flatulenta, diuretica, aphrodisiaca.

VSVS:

TETRADYNAMIA. SILIQVOSA. 105

vsvs: Aphtha, Pernio, Otagia, Stranguria, Calculus, Colica; Asthma, Tussis-decoctum radicis et oleum expressum feminis.

SINAPIS *nigra* filiquis glabris racemo appressis. *Linn. Sp. pl.* 933. *Mat. med.* 457. — *Mustard-Seed.*

LOC. Colitur in hortis. *Annua.*

PHARM. *Sinapeos* Semina.

QVAL. acris, orgastica. *Culinaris, trita, praeftans.*

VIS: incidens, rubefaciens, stimulanS, diuretica, aphrodisiaca, antiscorbutica.

vsvs: Cephalalgia! Nausea, Cachexia, Lethargus, Tussis, Calculus, Tinea, Scorbutus.

RAPHANVS *fativus*, filiquis teretibus torosis bilocularibus. *Linn. Sp. pl.* 935. *Mat. med.* 458.

LOC. Colitur in hortis. *Annua.*

PHARM. *Raphani* Radix (recens.)

QVAL. aquoso-acris, orgastica. *Culinaris, exoleta.*

VIS: diluens, attenuens, mundificans, diuretica, carminativa, ructatrix.

vsvs: Asthma convulsivum, Raucedo, Ischuria.

228. BVNIAS *Cakile* filiculis ovatis laevibus ancipitibus. *Linn. Sp. pl.* 936. *Gr. virg.* 98. — *Sea-Cale.*

LOC. NovaeAngliae — Virginiaemaritima. *Annua.*

PHARM. *Cakiles* Herba.

QVAL. acris. *Culinaris.*

VIS: diuretica, antiscorbutica —

vsvs: Diaeteticus, Scorbutus. —

106 TETRADYNAMIA. SILIQVOSA.


229. CLEOME *dodecandra* floribus dodecandris,
foliis ternatis. *Linn. Sp. pl.*

Loc. Pensylvania; ad ripas fluv. Susquehannah,
prope Wyoming etc. *Annua.*

QUAL. Planta tota viscida, odore nauseoso.
VIS: Rad. anthelminthica.

229. *Cal.* quadrifidus: laciniis 2 oppositis majoribus. *Pet.* 4. un-
guiculata, emarginata, alba. *Stam.* 12. corolla longiora. *Sil-*
liqua polysperma.





CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

TAMARINDVS *indica*. Linn. Sp. pl. 48. *)
 Loc. Bahama. Arbor.

PHARM. *Tamarindi* Pulpa, Conditum.

QVAL. acidula, subnauseosa. Trita, praeſtans.

VIS: refrigerans, eccoprotica.

VSVS: diaeteticus; Febres, obſtructio alvi.

DECANDRIA.

230. GERANIVM *maculatum* pedunculis biſſo-
 ris, caule dichotomo erecto, foliis quinque-
 partitis incisis: ſummis ſeſſilibus. Linn. Sp.
 pl. 955. Gr. virg. 101. Amoen. acad. 4. p. 522.
 Loc. Nova-Anglia — Carolina. Perennis.
 Radix leniter adſtringens, vulneraria habetur et
 ad Dyſenteriam laudatur.

POLYANDRIA.

231. SIDA *Abutilon* foliis ſubrotundo-cordatis
 indiviſis, pedunculis folio brevioribus, cap-
 ſulis multilocularibus: corniculis biſidis. Linn.
 Sp. pl. 963. Gr. virg. 78. ed. n. 101.
 Loc. — Virginia. Annua.
 PHARM. *Abutili* Herba, Radix.

QVAL.

*) Stamina monadelpha. Linn, amoen, acad. 8. p. 522.

QUAL. mucilaginosa.

VIS: emolliens, lubricans.

VSVS: Malvae vulgaris.

232. *MALVA rotundifolia* caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Linn. Sp. pl.* 969. *Mat. med.* 463. *Gr. virg.* 79. *ed. n.* 102. — *Mallow.*

LOC. Novae Angliae — Virginiae ruderata. *Annua.*
PHARM. *Malvae vulgaris* Radix, Herba, ▽, Semina.

QUAL. fatua, mucilaginosa. *Trita, praestans.*

VIS: emolliens, inviscans, lubricans, laxans.

VSVS: Phlogistici, Dolores, Stranguria!

COMP. Syr. Hyssopi, Syr. Althaeae; Clysteres.

GOSSYPIUM *herbaceum* foliis quinquefidis subtus eglandulosis, caule herbaceo. *Linn. Sp. pl.* 975. — *Cotton.*

LOC. Terra-Mariana — Florida. *Culta.*

Biennis, Annua.

PHARM. *Gossypii* Semina.

Bombacis Lana.

QUAL. subdulcis, oleosa Sem.

VIS: emolliens.

VSVS: Sem. Nephritis. (*Ol. Ephelis. Rumph.*)

COMP. Bomb. ad medicamenta otica applicanda.

233. *HIBISCUS Moscheutos* foliis ovatis acuminate ferratis, caule simplicissimo, petiolis floriferis. *Linn. Sp. pl.* 975. *Gr. virg.* 102. *Corn. canad. t.* 145.

LOC.

Loc. Canadae — Virginiae paludosa. *Perennis*.
Radix paregorica est. *Clayt.*

HIBISCVS *esculentus* foliis quinquepartito-
pedatis, calycibus interioribus latere rum-
pentibus. *Linn. Sp. pl.* 980. *Kalm. it.* 2.
p. 209. — *Okra.*

Fructus immaturi cocti, oleo, aceto etc. con-
diti ad juscula carnis inspissanda, aliosque
usus inferviunt.

vis: nutriens, aphrodisiaca.





CLASSIS. XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

234. FVMARIA *Cucullaria*, scapo nudo. *Linn.*
Sp. pl. 903. *Gr. virg.* 103. *Corn. canad.* 127.
 LOC. Canada — Virginia. *Biennis.*
 VIS: sanguinem depurans eximia esse dicitur.

OCTANDRIA.

235. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus
 spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo,
 foliis lato lanceolatis. *Linn Sp. pl.* 990 *Mat.*
med. 468. *Amoen. acad.* 4. p. 523. *Mill. dict.*
tab. *Gr. virg.* 103. — *Senega Snake-root.*
Rattle-Snake-root.
 LOC. Noveboracum — Virginia. *Perennis.*
 PHARM. *Senegae Radix.*
 QVAL. acido-acris, subaromatica. *Heroica.*
 VIS: resolvens, sialagoga, subemetica, pur-
 gans, diaphoretica, diuretica, expectorans,
 vulneraria.
 vsvs: Morsura! Peripneumonia! Pleuritis! Hy-
 drops! Arthritis, Marasmus.

DECANDRIA.

236. LVPINVS *perennis*, calycibus alternis in-
 appendiculatis: labio superiore emarginato,
 inferiore integro. *Linn. Sp. pl.* 1014. *Gron.*
virg.

virg. ed. n. 104. Mill. dict. t. 100. f. 1. Kalm. it. 3. p. 96.

LOC. Noveboraci — Virginiae pascua. *Perennis*,
PHARM. *Lupini Semina*.

QVAL. *ficca*.

VIS: *flatulenta*.

Planta pecoribus, equis praecipue, grata.

PHASEOLVS *vulgaris* caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Linn. Sp. pl. 1016. Mat. med. 474. — French-bean.*

LOC. Horti. *Annua*.

PHARM. *Phaseoli Semina*.

QVAL. *ficca, farinacea. Culinaris.*

VIS: *nutriens, flatulenta, cosmetica.*

VSVS: *Nephritis.*

PISVM *fativum* petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Linn. Sp. pl. 1026. Mat. med. 476. — Pea.*

LOC. Americae agri. *Annua.*

PHARM. *Pisi Semina*.

QVAL. *dulcis, ficca, farinosa. Culinaris.*

VIS: *nutriens, flatulenta.*

VICIA *Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Linn. Sp. pl. 1039. Mat. med. 477. — Bean.*

LOC. Horti. *Annua.*

PHARM. *Fabae Flores, ▽, Semina, Farina, Cineres, ⊖.*

QVAL. *ficca, farinosa. Fl. fragrans. Culinaris.*

VIS: *nutriens, flatulenta, cosmetica.*

VSVS:

vsvs: Tumor glandularum.
 COMP. Farinae IV resolventes.

237. INDIGOFERA *argentea*, foliis pinnatis
 tomentosis obovatis, caule fruticoso. Linn.
mant. 27.

LOC. Carolina — Florida. *Annua, culta.*

PHARM. *Indigo* commune, optimum.

QVAL. succi faeculae exsiccatae caeruleae, tin-
 ctoriae.

vis: obstruens! phthiriaca.

vsvs: Diarrhoea, Lochia.

238. ROBINIA *Pseudo-Acacia* racemis pedicellis
 unifloris, foliis impari pinnatis, stipulis spi-
 nosis. Linn. *Sp. pl.* 1043. *Gr. virg.* 105. *Mill.*
dict. n. 1. — *Locust-tree.*

LOC. Nova Anglia — Carolina. *Arbor.*

PHARM. *Pseudo-Acaciae* Flores, Radix, Semina.

QVAL. Rad. et Cort. dulcis, Glycyrrhizae odo-
 re. *Clayt.* Fl. fragrans; apibus expetita;
 Sem. oleosa.

vis: Rad. et Cort. pectoralis. Fl. laxans.

Folia pecoribus praebent pabulum sanum et ac-
 ceptum.

ABRVS *precatorius*. Linn. *syst.* 641.

LOC. Bahama. — Florida. *Frutex.*

PHARM. *Abri* Semina, Folia.

QVAL. fol. dulcis, mucilaginosi. Sem. farinacea.

vis: fol. expectorans. Sem. purgans, noxia?

239. ARACHIS *hypogaea*. Linn. *Sp. pl.* 1040. —
Ground-nuts. Beanuts.

LOC. Terra Mariana — Florida. *Annua, culta.*

PHARM.

PHARM. *Arachidis* Semina, Oleum.

QVAL. pinguis. Semina tosta Cacao fructus sapore aemulantur.

VIS: nutriens.

Conf. *Acta Societ. philos. Americanae* Vol. I.

240. TRIFOLIUM *Melilotus officinalis* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Linn. Sp. pl.* 1078. *Mat. med.* 485.

Melilotus fl. albo, frutescens. *Gr. virg. ed. n.* 111.

LOC. Virginia. *Biennis.*

PHARM. *Meliloti albae* Flores, Herba.

QVAL. fragrans, gravis, mucilaginosus.

Trita, praestans.

VIS: resolvens, emolliens, lubricans.

VSVS: Dysuria, Leucorrhoea.

COMP. Empl. *Meliloti*.

241. TRIFOLIUM *repens* caule capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Linn. Sp. pl.* 1080. *Mat. med.* 486. *Gr. virg.* 85. *ed. n.* 110.

LOC. Virginia. *Perennis.*


PHARM. *Trifolii albi* Flores.

QVAL. suaveolens.

Rarior.

VSVS: Arthritis.





CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

THEOBROMA *Cacao* foliis integerrimis.

Linn. Sp. pl. 1100. Mat. med. 488. Cat. Carol. 3. p. 6. t. 6.

LOC. Bahama.

Arbor.

PHARM. *Cacao* Fructus, Oleum expressum (Butyrum.)

QUAL. pinguis, subamara. *Culinaris, praestans.*

VIS: nutriens, aphrodisiaca, calefaciens tosta.

VSUS: Tabes, Hypochondriasis, Haemorrhoids.

COMP. Chocolata.

ICOSANDRIA.

242. CITRVS *Medica*, petiolis linearibus. *Linn.*

Sp. pl. 1100. Mat. med. 489. — Lemon.

LOC. Carolina — Florida.

Arbor, cicur.

PHARM. *Citri* Flavedo, Essentia de Cedro. Cortex, conditus, Essentia, ∇ , \sqcup , $\circ\circ$. Caro, condita, Succus, Conserva. Syrupus, Semina, Flores.

QUAL. Flavedo, aromatica, odorata vesiculis oleosis. Cort. alba obstipans, tonica. Pulpa acida. Sem. amara. Fl. fragrans. *Trita, optima.*

VIS: Flav. cardiaca, pellens, stomachica. Pulp. refrigerans, diuretica. Sem. anthelmintica. Fl. analeptica.

VSUS: Pulp. Putridi, Phlogistici, Sitis, Scorbustus, Raucedo.

β . *Malus Limonia* acida. *Bauh. pin. 436.*

LOC.

LOC. Bahama etc.

PHARM. *Limoniorum Succus*.

QVAL. Citro acidior.

VIS: Citro magis refrigerans.

VSVS: Calculus?

243. CITRVS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acuminatis. *Linn. Sp. pl.* 1100. *Mat. med.* 490.

LOC. Carolina — Florida. *Arbor, cicur.*

PHARM. *Naphae* (Flores) Conditae, Conserva,

▽, ∟. *Aurantii* Folia, Poma immatura,

Cortex, conditus, Syrupus, Effentia, ▽,

∟, ∞ (Bergamotte) Flavedo, Effentia.

QVAL. amara. Naph. fragrans. *Trita, eximia.*

VIS: tonica, stomachica, corroborans, anthelminthica, pellens. Naph. analeptica.

VSVS: Convulsiones, Hysteria, Hypochondriasis, Icterus, Ischuria, Scorbutus, Haemorrhagia uteri.

POLYANDRIA.

244. HOPEA *tinctoria*. *Linn. Syst. nat.* 509.

Mant. 105. — Sweet-leaf.

Arbor lauri folio etc. *Cat.* 1. 54.

LOC. Carolina — Florida.

Frutex.

PHARM. *Hopeae* Radix, Folia.

QVAL. Rad. amara, aromatica.

VIS: Rad. stomachica, sanguinem depurans.

VSVS: — Succus expressus et decoct. folior. lanas et sericea flavo colore pulchre tingunt.

245. HYPERICVM *virginicum*? *Linn. Sp. pl.* 1104. — vel alia species virginica?

E floribus tincturam spirituosam praeparant, quae ad Vomitus, Dolores Colicos aliosque adhibetur morbos.



CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

SCORZONERA *hispanica* caule ramoso, foliis amplexicaulibus integris ferrulatis. Linn.
Sp. pl. 1112.

Loc. Horti. —

PHARM. *Scorzoneræ* Radix, condita, ▽, Semina.

QUAL. amaricans, lactescens. Trita, infida.

VIS: alexiteria?

VSVS: Morfura? Venenum?

LACTUCA *sativa*, foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymbofo. Linn. Sp. pl. 1118.
Mat. med. 495.

Loc. Horti.

PHARM. *Lactucæ* Herba.

QUAL. aquosa oleracea lactescens.

Rarior, superflua.

VIS: refrigerans, diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.

VSVS: Hypochondriasis, Satyriasis.

246. PRENANTHES *alba*, flosculis plurimis, floribus nutantibus subumbellatis, foliis hastato - angulatis. Linn. Sp. pl. 1121. Gron. virg. 113.

Prenanthes autumnal. *ibid.* — Cold. noveb. 173.

Mill. dict. n. 3. — Dr. Witts Snakeroot.

Loc. Canada — Virginia.

PHARM.

SYNGENESIA. POLYGAMIA AEQUALIS. 117

PHARM. *Prenanthis* Radix.

QUAL. Pi. lactescens, viscosa,

VIS:

VSVS: Praesentaneum est remedium contra mor-
fus Caudifonae. *Adversf. Collinsf.* —

247. LEONTODON *Taraxacum* calyce squamis
inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis
laevibus. *Linn. Sp. pl.* 1122. *Mat. med.* 497.
Gr. virg. 176. *ed. n.* 114. *Cold. noveb.* 177. —
Dandelion,

LOC. Nova Anglia — Carolina. *Perennis.*

PHARM. *Taraxaci* Radix, Herba, ▽.

QUAL. aquoso-amaricans, oleracea, lactescens.
Culinaris, usitata.

VIS: saponacea, diluens, humectans, diuretica!

VSVS: Hypochondriasis, Icterus!

248. HIERACIVM *venosum*, foliis cuneiformi-
bus hirtis, scapo nudo crassissimo erecto.
Linn. Sp. pl. 1125. *Gr. virg.* 114. *Hieracii* sp. 2.
Cold. noveb. 175.

LOC. Novebor. — Virginia.

Ad Morsuram Crotali et aliorum serpentum
(*Pilote-Snake* etc.) laudatur.

249. HIERACIVM *Gronovii*, caule paniculato
subnudo, foliis radicalibus obovatis integer-
rimis pilosis. *Linn. Sp. pl.* 1127. *Gr. virg.*
l. p. 90. *ed. n.* 114.

LOC. Pensylvania — Virginia. *Perennis.*

Radix commanducatur adversus dentium dolores.

250. CICHORIVM *Intybus*, floribus geminis
sessilibus, foliis runcinatis. *Linn. Sp. pl.* 1142.
Mat. med. 499.

118 SINGENESIA. POLYGAMIA AEQUALIS.

LOC. Noveboraci pascua, margines agrorum.

Perennis.

PHARM. *Cichorii* Radix, condita; Herba, Syrupus, ▽, Flores; Conserva, Semina.

QUAL. aquoso-amara, flavo-tinctoria.

VIS: aperiens, tonica, diuretica.

VSVS: Melancholia, Hypochondriasis, Hæctica, Haemorrhagia, Podagra.

COMP. Sem. IV frigida minora; Syr. *Cichorii* cum Rheo.

CICHORIVM *Endivia*, floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Linn. Sp. pl.* 1142. *Mat. med.* 400.

LOC. Horti.

PHARM. *Endiviae* Herba, Syrupus, Semina, ▽.

QUAL. oleracea.

VIS: aperiens, diuretica, mundificans, eccoprotica.

VSVS: Icterus.

COMP. Sem. IV. frigida minora.

251. ARCTIVM *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 1143. *Mat. med.* 501. *Gr. virg.* 116.

LOC. Noveboraci — Virginiae culta rudrata.

Perennis.

PHARM. *Bardanae* Radix, Herba, Semina.

QUAL. dulci-subauftera, urinaria alba, crepitans. Sem. amarissima. *Trita.*

VIS: esculenta, diuretica, mundificans. Sem. purgans.

VSVS: Phlogosis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.

COMP. Ess. *Bardanae* composita.

252. *SERRATULA praecalta*, foliis lanceolato-oblongis serratis subtus hirsutis. *Linn. Sp. pl.* 1146. *Cold. noveb.* 178. — *Common-Ironweed.*

Herba et radix cocta, variis venenis opponitur.

253. *SERRATULA spicata* foliis linearibus, (basi ciliatis?) floribus spicatis sessilibus lateralibus, caule simplici. *Linn. Sp. pl.* 1147. *Amoen. acad.* 4. p. 515. *Gr. virg.* 116. — *Throatwort. Lobelia* (falso nonnullis).

LOC. Pennsylvaniae — Virginiae sylvae steriles subhumidae. *Perennis.*

PHARM. *Serratulae spicatae* Radix.

QUAL. odore et sapore terebinthinaceo, oleoso, amariusculo; calida.

VIS: diuretica, discutiens.

VSVS: Gonorrhoea, Angina.

COMP. Gargarismata, Epithemata.

254. *SERRATULA scariosa* foliis lanceolatis integerrimis, calycibus squarrosis pedunculatis obtusis lateralibus. *Linn. Sp. pl.* 723. — *Roughroot-Lobelia.*

LOC. Pennsylvania.

PHARM. *Serratulae scariosae* Radix.

QUAL. acris, subamara.

H 4

VIS:

254. *Radix tuberosa.* *Caul.* rectus, simplex, teres, pubescens, scabiusculus. *Folia* alterna, lineari-lanceolata, utrinque acuminata, integerrima, glabra, sessilia, long. poll. $1\frac{1}{2}$. lat. linear. 2. *Flores* alterni, pedunculis unifloris teretibus, pubescentibus, foliolis 2-3-4 instructis. *Cal.* oblongus imbricatus squamis exterioribus brevioribus lanceolatis, acutis, patulis, interioribus obtusis subviscidis. *Recept.* planum, nudum. *Cor.* tubulosae, 5. fidae: laciniis lanceolatis, pallide caerulescentibus. *Semina* oblonga, angulata, basin versus attenuata. *Pappus* simplex, pilosus.

vis: diuretica.

vsvs: Gonorrhoea. — Rad. decoct. dilutum, largiter fumendum.

CARLINA *acaulis*? (*Forster's Catal. of North. Americ. Plants. Lond. 1771.*)

Carlina foliis sessilibus sinuatis, angulis spinosis, caule unifloro. *Gr. virg* 117. flore luteo. Plantam *Carlinae* *acauli* similem, in Rhodensisland vidi, non autem flores.

Carlinae Rad. *Linn. Mat. med.* 503.

QUAL. graveolens, acris, amara, aromatica.

vis: pellens, sudorifera, stomachica.

vsvs: Hypochondriasis, Hysteria.

CARTHAMVS *tinctorius* foliis ovatis integris ferrato-aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 2162. *Mat. med.* 504.

LOC. Horti,

PHARM. *Carthami* Flores, Semina.

QUAL. nauseosa, lutea.

vis: purgans, diuretica.

vsvs: Tussis senilis, Asthma, Hydrops, Icterus.

255. **EVPATORIVM** *purpureum*, foliis quaternis scabris lanceolato-ovatis inaequaliter ferratis rugosis petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 1173. *Amoen. acad.* 4. p. 522. *Cornut. canad.* 72. t. 72. *Cold. noveb* 180. *Gr. virg.* 119.

LOC. Canada — Virginia. *Perennis.*

Herba antisyphilitica creditur.

256. **BIDENS** *tripartita*, foliis trifidis, calycibus subfoliosis, feminibus erectis. *Linn. Sp. pl.*

pl. 1165. Gr. virg. ed. n. 118. — Spanish Needle.

Folia odore Dauci praedita. Clayton. Succedaneum Ac mellae. Commerc. lit. norimb. Herba tingit lanas fulvo colore,

257. EUPATORIUM *perfoliatum*, foliis connato - perfoliatis tomentosis. Linn. Sp. pl. 1174. Amoen. acad. 4. p. 520. Cold. noveb. 181. Gr. virg. 119.

Loc. Novae Angliae — Virginiae aquosa
Perennis.

PHARM. *Eupatorii perfoliati* Herba.

QUAL.

VIS: emetica, purgans, diaphoretica.

VSVS: Herbae decoct. Febres intermittentes, Arthritis, Rheumatismus, Podagra. Extern. Dolores.

POLYGAMIA SUPERFLVA.

258. TANACETUM *vulgare* foliis bipinnatis incisissimis serratis. Linn. Sp. pl. 1184. Mat. med. 508. — Tansey.

Loc. Noveboraci culta, rudrata, Perennis.

PHARM. *Tanacetum* Flores, Semina, Herba, ▽,



QUAL. amara, nidorosa, halituaosa, luteo - tinctoria.

VIS: carminativa, pellens, sudorifera, emmenagoga, anthelminthica! antiputredinosa, balsamica, tonica, stomachica

VSVS: Tertiana, Hysteria, Cachexia, Hydrops, Lumbrici.

259. *ARTEMISIA campestris*, foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Linn. Sp. pl.* 1185. *Gr. virg.* 120.

Loc. Virginiae sicca.

Perennis.

Sem. anthelminthica.

260. *GNAPHALIVM margaritaceum*, herbaceum, foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis. *Linn. Sp. pl.* 1198. *Amoen. acad.* 4. p. 518. *Kalm. it.* 2. p. 257. — Cudweed - Cottonweed - *Sempervivum*.

Loc. Novae Angliae — Pensylv. campi.

PHARM. *Gnaphalii margaritacei* Herba.

QUAL. spirans.

VIS: anodyna.

VSVS: Pulv. et decoct. Dysenteria, Haemorrhagiae hominum pecorumque. *Hill's herbal.* p. 454.

Frequentatur in balneis et tumoribus frigidis, contusionibus et contracturis; misceri quoque *Sarothrae* solet.

261. *ERIGERON*. — *Robert's Plantain. Bethlehemi.*

Erigeron. Linn. Amoen. acad. 4. p. 514.

Loc. Pensylvania —

Perennis.

PHARM. *Erigerontis* Rad. Herba.

QUAL. amaricans, acriuscula, pungens. *Eximia.*

VIS:

VSVS:

261. *Radix repens. Folia* radicalia ovata s. obovata, basi attenuata, dentata dentibus paucis a medio ad apicem, glanduliferis, obtusa, pilosa, venis paucis. *Scapus* biuncialis — pedalis, striatus, villosus, ligulis aliquot (3. 4.) linearibus alternis; uniflorus, sub flore incrassatus. *Cal.* squamæ acutae, (inferiores breviores latioresque) pubescentes. *Cor.* radii longae, angustae, trifidae.

vsus: Tumores duri, frigidi. Rad. externe.
Morsura Serpentum! Herba.

Decoct. herbae largiter bibendum; herba ipsa
vulneri imponenda. *Dr. Otto.*

262. *SENECIO vulgaris*, corollis nudis, foliis
pinnato - sinuatis amplexicaulibus, floribus
sparsis. *Linn. Sp. pl.* 1216. *Gr. virg. ed. n.* 125.
Loc. Virginiae culta. *Annua.*

Foliorum infusum emeticum lenius; radix odo-
ra, recens effossa Cephalalgiae medetur.
Hill's herbal. p. 451.

Aestum temperat et vulnerariam possidet vir-
tutem.

Externe in lacte coctus ad testium inflamma-
tionem adhibetur. *Vogel.*

Seminibus delectantur passeris canori caveis
inclusi.

163. *SENECIO aureus*, corollis radiantibus, fo-
liis crenatis: infimis cordatis petiolatis: su-
perioribus lyratis pinnatifidis. *Linn. Sp. pl.*
1220. *Gr. virg. ed. n.* 126.

Loc. Canadae — Virginiae madida umbrosa.
Perennis.

PHARM. *Senecionis aurei* Herba, Radiculae.

QUAL. Rad. brunneae, odore grato.

VIS: repellens, vulneraria, sanguinem congru-
matum dissolvens.

Vsus: Sugillatio, Casus ab alto; Indigenis Ame-
ricanis remedium tritum.

164. *SOLIDAGO*. . . .

Virga

264. *Caulis* tenuis, pedalis, purpureus; *racemus* terminalis,
tertiam caulis partem obfidens; *flores* flavi 3-4. ex alis so-
liorum. *Ven. Muhlberg* *Lanceariae.*

Virga aurea americana hirsuta, radice odorata.

Dill. elth. 410. t. 304. f. 391. Linn. Sp. pl. 1233?

Herbae decoctum in Morsura Caudisonae interne sumitur, eaque ipsa externe Vulneri imponitur. Tumores anginoideos tollit, pe-
ctoris dolores mitigat; humores viscidos in-
cidit, dissolvit.

SOLIDAGINIS alia species, Theae Boheae succedaneum praebebat Monticolis tempore belli.

264. INVLA *Helenium* foliis amplexicaulibus ova-
tis rugosis subtus tomentosis, calycum squa-
mis ovatis. *Linn. Sp. pl. 1236. Mat. med. 526.*
Helenium f. *Enula campana*, *Gron. virg. ed.*
n. 125.

LOC. Virginia. *Perennis.*

PHARM. *Enulae Radix*, *Condita*, *Conserva*, *Es-*
sentia, *Extractum*, ∇ .

QUAL. aromatica, mucilaginoso. *Trita*, *prae-*
vis: alexiteria, pellens, expectorans, stoma-
chica, anthelminthica.

VSVS: Tussis, Asthma humidum, Hypochondria-
sis, Colica, Tremor, Scabies!

265. HELENIVM *autumnale*. *Linn. Sp. pl. 1248.*
Helenium foliis decurrentibus. *Gr. virg. ed.*
nov. 126. Aster luteus alatus. Corn. ca-
nad. 52. t. 63.

LOC. Canadae — Virginiae madida. *Perennis.*

QUAL. Tota planta amaritudine notabili praedita.

VSVS: In febribus tertianis utilis esse creditur.

Clayt.

Hele.

Helenium? — an eadem, diversae species?
 Planta 3 - 4. ped. ramosa, fol. alternis de-
 currentibus incis. — Recept. conicum nu-
 dum. Semina villosa. Pappo 2 - 3. dentato,
 subulato.

Sneeze-root. Pensylvanis. — Omnes plantae par-
 tes, tam recentes quam siccae, maxime au-
 tem folia, acres, erinae, sternutatoriae.
Bartram.

An: Ptarmicae affinis, altissima frutescens an-
 nua? *Gron. virg. ed. n. 126.*

Eclipta erecta. Mill. dict. n. 2.

Folia contrita succum nigrum praebent, quo
 ad capillos tingendos utuntur nonnulli.

266. CHRYSANTHEMUM *Leucanthemum*, fo-
 liis amplexicaulibus oblongis: superne fer-
 ratis, inferne dentatis. *Linn. Sp. pl. 1251.*
Mat. med. 526. Gr. virg. ed. n. 126.

LOC. Novae Angliae — Virginiae pascua. *Perennis.*
 PHARM. *Bellidis pratensis* Herba.

QUAL. subacris, penetrans, piperata in deco-
 cto. Fol. odorata. *Clayt.*

VIS: diuretica, vulneraria.

VSVS: Phthisis, Asthma, Tinea.

267. ANTHEMIS *Cotula*, receptaculis conicis,
 paleis setaceis, seminibus nudis. *Linn. Sp. pl.*
1261. Amoen. acad. 4. p. 522. Mat. med.
530. Gr. virg. 127. — May-flower.

LOC. Novae Angliae — Virginiae agri. *Annua.*
 PHARM. *Cotulae foetidae* Herba, Flores.

QUAL. foetida, amara. *Inusitata, eximia.*

VIS: anodyna, pellens, repellens.

VSVS:

126 SYNGENESIA. POLYGAMIA FRVSTRANEA.

vsvs: Hysteria! Epilepsia, Hydrops, Scrophula, Asthma. — Infus. Rheumatismus, Contusiones.

268. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis. *Linn. Sp. pl.* 1267. *Mât. med.* 534. *Gr. virg. ed. n.* 127.

LOC. Novae Angliae — Virginiae pascua, prat. Perennis.

PHARM. *Millefolii* Herba, Essentia, Extr. ▽, ∞.

QUAL. amaricans, nidorosa.

VIS: narcotica, inebrians, tonica, sistens evacuationes, vulneraria.

vsvs: Hypochondriasis, Haemorrhoids, Haemoptysis, Vulnus.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

269. HELIANTHVS *annuus* foliis omnibus cordatis, trinervatis, floribus cernuis. *Linn. Sp. pl.* 1277. — *Sunflower.*

LOC. Mexico. Amer. sept. horti. Annuua.

PHARM. *Helianthi* Semina, ☉.

QUAL. oleosa.

Sem. trita, inter laminas ferreas conquassata oleum largiter praebent. *Amer. philos. Transact. Vol. 1. p.* 234. etc.

270. HELIANTHVS *tuberosus*, foliis ovato-cordatis triplinerviis. *Linn. Sp. pl.* 1277. *Mill. dict. n.* 3. *Gr. virg. ed. n.* 129. — *Jerusalem-Artichoke.*

Radix

Radix tuberosa, dulcis, esculenta; saccharum, Cerevisiam etc. praebet.

271. HELIANTHVS *giganteus*, foliis alternis lanceolatis scabris basi ciliatis, caule stricto scabro. *Linn. Sp. pl.* 1278. *Gr. virg.* 129.

Seminum farina, mixta cum farina Zeae Mays, panem praebet haud spernendum.

272. RVDBECKIA *purpurea*, foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, petalis radii bifidis. *Linn. Sp. pl.* 1280. *Gr. virg.* 130. *Mill. dict.* t. 224 f. 1.

Chrysanthemum doronici folio. *Cat. Carol.* 2. p. 59. t. 59.

Loc. Virginia — Carolina. —

Radix sapore acri et fervidissimo, ad ulcera equorum dorsalia sananda plurimum valere fertur. *Clayt.*

Coreopsis verticillata foliis decomposito - pinnatis linearibus. *Linn. Sp. pl.* 1281. *Gr. virg.* ed. n. 131. *Mill. dict.* n. 3.

Petalis huius plantae (quamvis flavis) Incolae occidentales pannos colore rubro tingunt. *Clayt.*

273. CENTAVREA *Benedicta* calycibus duplicato - spinosis lanatis involucreatis, foliis semi - decurrentibus denticulato spinosis. *Linn. Sp. pl.* 1296. *Mat. med.* 537.

Cnicus caule diffuso, foliis dentato - sinuatis. *Gr. virg.* ed. n. 117.

Loc. Virginia.

Annua.

PHARM. *Cardui Benedicti* Herba, Conserva, ▽, Acetum, Flores, Semina.

QVAL. amarissima. *Vsitata, praestans.*

VIS: balsamica, antacida, tonica, pellens, purgans, sudorifera, diuretica, subemetica.

VSVS: Anorexia, Cachexia, Arthritis, Vertigo, Hemicrania, Tertiana, Pleuritis, Pestis, Sugillatio.

MONOGAMIA.

274. *LOBELIA sypilitica* caule erecto, foliis ovato - lanceolatis subserratis, calycum sinibus reflexis. *Linn. Sp. pl.* 1320. *Amoen. acad.* 4. p. 518. *Mat. med.* 540. *Gr. virg. ed. n.* 134. Loc. *Novae Angliae* — *Virginiae sylvae aridae lutosae.* *Perennis.*

PHARM. *Lobeliae* Radix.

QVAL. lactescens, acris, nauseosa. *Eximia.*

VIS: pellens, purgans, emetic.

VSVS: Syphilis!

Lobelia Cardinalis, caule erecto, foliis lanceolatis serratis, spica terminali. *Linn. Sp. pl.* 1320. *Gr. virg.* 134.

QVAL. lactescens, acris.

VSVS: idem?

275. *LOBELIA inflata*, caule erecto, foliis ovatis subserratis pedunculis longioribus, capsulis inflatis. *Linn Sp. pl.* 1320. *Gr. virg.* 134.

QVAL. Rad. adstringens.

VSVS: Ophthalmia.



276. IMPATIENS *Noli tangere*, pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. Sp. pl.* 1329. *Gron. virg. ed. n.* 135. *Cold. noveb.* 207.

Loc. Canadae — Virginiae nemora. *Annua.*

Venenata perhibetur. Folia extus imponi possunt haemorrhoidibus. *Vogel.* — Emetica, eccoprotica. Tinctoria.

Herbae decoctum diureticum, in morbis urina-riis; — ad lotionem vulnerum, adhibetur.





CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

277. ORCHIS floribus sparsis, nectario pedunculum superante, labio infimo lineari. Gr. virg. ed. n. 137.

Radix Venerem stimulat. Clayt.

EPIDENDRON *Vanilla* scandens, foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus. Linn. Sp. pl. 1347.

Volubilis filiquosa, plantaginis folio. Cat. Carol. 3. p. 7. t. 7.

LOC. Bahama.

Parasitica, Frutex.

PHARM. *Vanillae* Siliqua. 3β.

QUAL. pinguis, ambrosiaca.

VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodisiaca.

VSVS: Melancholia, Atecnia.

COMP. Chokolata.

278. ARETHUSA *bulbosa*? Linn. Amoen. acad. 4. p. 518.

Radix contusa auribus admota otalgiam compescit, et ad apostemata aperienda mirifice confert.

PENTANDRIA.

279. PASSIFLORA *lutea*, foliis trilobis cordatis aequalibus obtusis glabris integerrimis. Linn. Sp. pl. 1358. Gr. virg. ed. n. 140.

Fructus,

GYNANDRIA. PENTANDRIA. 131

Fructus subacidus; Syrupus inde paratur, gratus et in febris utilis.

PASSIFLORA *incarnata*; foliis trilobis serratis. *Linn. Sp. pl.* 1360. *Gr. virg.* 140.

Fructus a nonnullis inter edulia habetur. *Clayt.*

Passiflorae species, in Carolina adversus morbum quendam epilepticum canum adhibetur (vulgo *the Staggers*) — Succus ex caule contuso expressus cani propinatur, et caule ipso corpus circumligant.

HEXANDRIA.

280. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuosis teretibus, floribus solitariis. *Linn. Sp. pl.* 1363. *Mat. med.* 546. *Gr. virg. ed. n.* 140. *Cat. Carol. 1. t.* 29. — *Virginiam Snakeroot.*

Loc. Noveb. — Carolina. *Perennis.*

PHARM. *Serpentariae Virginianae Radix*, 3ß. Effentia.

QUAL. acris, hircosa odore Valerianae.

Trita, eximia.

VIS: pellens, diaphoretica, exanthematica, alexiteria, diuretica, anthelminthica.

VSUS: Febres intermittentes, exanthematicae, Morsura.

COMP. Pulv. comit. Kent.

DECANDRIA.

281. ARISTOLOCHIA. . .

I 2

LOC.

281. *Frutex* scandens, cortice cinereo, rugoso. *Folia* alterna, remota, longe petiolata, gemina, cordato-ovata, acuta, integerrima.

Loc. Pennsylvaniae montosa, prope fluv. Ohio etc.

PHARM. *Sassaparill - Vine.*

QUAL. Cortic. et Ligni gūmmoso-resinosa, terebinthinacea, fragrans, calida, amariuscula. Sem. valde amara.

vis: pellens! diuretica!

vsus: Decoct. in Hydrope, Cachexia, aliisque Morbis.

HELICTERES *Iso*ra, foliis cordatis serratis, fructu composito contorto. *Linn. Sp. pl.* 1366. *Brown. jam.* 1. p. 330. *Sloan. jam.* 97. *bist.* 1. p. 22.

Loc. Bahamae insulae. *Frutex.*

Succus radicis amaricans, vel radix ipsa, in Malabaria ad Morbos Ventriculi, Ulcera pulmonum, Exanthemata et Panaritia laudantur.

POLYANDRIA.

ARVM *esculentum*, acaule, foliis peltatis ovatis integerrimis basi semibifidis. *Linn. Sp. pl.* 1369.

In Carolina colitur. *Tanjards.* vulgo. —

ARVM *sagittae-folium*, acaule foliis sagittatis triangulis: angulis divaricatis acutis. *Linn. Sp. pl.* 1369. *Cat. Car.* 1. 83.

Semina recentia acria, calida; cocta autem edulia, Indigenis Americanis grata et salubria habentur.

ARVM

tegerrima, glabra; long. folior. poll. 6-8. latit. in med. 6-7. Petiolus teres, glaber. *Capsula* cylindrica, glabra, leviter 6-fulcata, longit. poll. 3-5. *Locum.* 6. *Sem.* plurima, subtriangula, plana.

ARVM *virginicum*, acaule, foliis hastato - cordatis acutis, angulis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1370. *Gr. virg. ed. n.* 142. *Kalm. it. 2. p.* 253. *Mill. dict. n.* 6.

Radix recens acris, urens; tosta autem edulis.

282. ARVM *triphyllum*, acaule, foliis ternatis, floribus monoicis. *Linn. Sp. pl.* 1368. *Gr. virg. ed. n.* 142. *Cold. noveb.* 215. — *Indian Turnip.*

LOC. Nova Anglia — Virginia. *Perennis.*

PHARM. *Ari Radix.* 3β.

QUAL. acris septica. *Trita, praestans.*

VIS: calefaciens, incidens, expectorans.

VSVS: Anorexia, Asthma humorale, Cachexia, Obstructio, Contusura, Lapsus ab alto.

283. DRACONTIVM *foetidum* foliis subrotundis concavis. *Linn. Sp. pl.* 1372. *Cold. noveb.* 214. *Gr. virg. ed. n.* 141.

Calla aquatilis. *Gr. virg. i.* 186. *Arum americ. Cat. Carol. 2. p.* 71. *t. 71. Kalm. it. 3. p.* 47. — *Skunckweed. Beerenwortel. Bonsemkruid.*


LOC. Novae Angliae — Carolinae humida, depressa. *Perennis.*

PHARM. *Dracontii Radix.* —

QUAL. acris, alliacea, nauseosa.

VIS: incidens, calefaciens, expectorans. —

VSVS: fol. contrita ad vulnera recentia et ulcera. Tussis consumtiva. Scorbutus et alii Morbi ubi radix Ari officin. utilis. *Colden.*





CLASSIS XXI.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

283. ZEA *Mays*. Linn. *Sp. pl.* 1378. — Indian
Corn.

LOC. America septentr. ubique. , *Culta, annua.*

PHARM. *Mays*. Semina, Culmi.

QVAL. Sem. farinacea. Culm. saccharina.

VIS:

VSVS: diaeteticus.

TETRANDRIA.

284. BETULA *nigra*, foliis rhombeo - ovatis
acuminatis duplicato - ferratis. Linn. *Sp. pl.*
1394. Gron. *virg.* 188. ed. n. 146. Mill. *dict.*
n. 4.

LOC. Nova - Anglia — Virginia. *Arbor, frequens.*

PHARM. *Betulae nigrae* Cortex, succus in-
spissatus. —

QVAL. Cortex gaudet Sapore Polygalae Sene-
gae. *Clayt.*

Ex succo inspissato Saccharum parari potest,
minus tamen gratum quam Aceris saccharini.

BETULA *lenta*, foliis cordatis oblongis acu-
minatis ferratis. Linn. *Sp. pl.* 1394.

Betula julifera. Gr. *virg.* 115. ed. n. 3. Mill.
dict. n. 3.

LOC. Canada — Virginia. *Arbor, frequens.*

PHARM. *Betulae lentae*, Cortex, Folia, Succus.

QVAL.

QVAL. Folia contrita odorem suavem balsamicum spirant. Saccharum praebet, uti antecedens.

BETVLA alba? — *Linn. Sp. pl.* 193. *Mat. med.* 554.

285. BETVLA *Alnus*, pedunculis ramosis. *Linn. Sp. pl.* 1394. *Gr. virg.* 146.

LOC. Novae Angliae — Virginiae, humida. *Frutex, frequens.*

PHARM. *Alni* Cortex, Folia.

QVAL. styptica.

VIS: adstringens, vulneraria, fol. recent. confus. lac repellens. Cort. cum Vitriolo atramentum nigrum praebet, brunneo tingit.

Coni ad nigrum tingendum adhibentur, eumque in finem vulgares exhibentur venales ficati in Iaponia. *Thunberg.*

BVXVS *sempervirens.* *Linn. Sp. pl.* 1394. *Mat. med.* 555.

LOC. Horti.

PHARM. *Buxi* Lignum $\circ\circ$. gtt. XX.

QVAL. tetra foetida, amara.

VIS: sudorifera, mundificans. Fol. purgans, pellens.

VSVS: Hirsuties Ol. Epilepsia, Hysteria.

286. VRTICA *dioica*, foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Linn. Sp. pl.* 1396. *Mat. med.* 557.

LOC. Noveboraci, Insulae longae rudrata.

Perennis.

PHARM. *Vrticae majoris* Radix, Herba, ∇ , Semina.

QUAL. urens tactu, subinsipida, oleracea.
 VIS: diuretica, mundificans, stimulans extus.
 VSVS: Icterus, Nephritis, Phthisis! Haemorrhagia, Haemoptysis, Haemorrhoids, Paralysis externe.

287. MORVS *rubra* foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis. *Linn. Sp. pl.* 1399.
Gr. virg. ed. n. 146. — *Red Mulberry.*
 LOC. Noveboracum — Carolina. *Arbor.*
 PHARM. *Mori* Rob, Syrupus (Cort. Rad.)
 QUAL. *Mori nigrae.* *L. Mat. med.* 558. — dulci - subacida.
 VIS: refrigerans, corroborans.
 VSVS: Febres putridae, Sitis, Angina. (Cort. Tacnia?)
 COMP. Mixture febriles.

PENTANDRIA.

288. XANTHIVM *strumarium*, caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Linn. Sp. pl.* 1400.
Mat. med. 559 *Gr. virg.* 188. *ed. n.* 146. — *Lowse-burre.*
 LOC. Nova Anglia — Virginia. *Annua.*
 PHARM. *Xanthii* Folia, Semina, 3ß.
 QUAL. luteo - tinctoria, amara, subacris.
 VIS: diaphoretica, adstringens, pellens.
 VSVS: Scrophula, Herpes, Erysipelas.

POLYANDRIA.

289. SAGITTARIA *sagittifolia*, foliis sagittatis acutis. *Linn. Sp. pl.* 1460. *Gr. virg.* 116.
ed. n. 148. — *Arrow-head.*

LOC.

Loc. Americae septentrion. fluvii, lacus.
vis: refrigerans, adstringens. — Radices tuberofae coluntur et eduntur in China. Osbeck.

290. QVERCVS *Phellos*, foliis lanceolatis integerrimis glabris. *Linn. Sp. pl.* 1412.

Willow - Oak. *Gr. virg. ed. n.* 149. *Cat. carol.* 1. t. 16.

β Live - Oak. *Cat. carol. t.* 1. p. 17. t. 17.

Loc. α) Pensylvania — Florida.

β) Carolinae Septentrion. — Floridae maritima.

Glandes omnium huius generis dulcissimae, ideoque ab Americanis Indigenis colliguntur, et vario modo praeparatae, eduntur. Oleum gratum et dulce amygdalino vix inferius, praebent. *Catesby*.

291. QVERCVS *Prinus*, foliis obovatis utrinque acuminatis sinuato-ferratis; denticulis rotundatis uniformibus. *Linn. Sp. pl.* 1413.

Gr. virg. 145. *Cat. Carol.* 1. t. 18. p. 18.

Loc. America borealis. *Arbor.*

Chesnut - Oak. — Succus vernalis copiosus, acido-dulcis, viatoribus sitientibus gratus. Glandes dulces, edules. Cortice coria colore rubro tingunt Americani.

292. QVERCVS *nigra*, foliis cuneiformibus obsolete trilobis. *Linn. Sp. pl.* 1413. *Gr. virg.* 117. *ed. n.* 149. *Cat. carol.* 1. p. 20. t. 20. et p. 19. t. 19.

Loc. America borealis. *Arbor.*

Black - Oak. — Corticis decoctum saturatum ad Rheumatismos chronicos laudatur ab Indigenis tanquam specificum. — Lanas flavo tingit.

293. *QVERCVS rubra* foliis obtuse sinuatis setaceo-mucronatis. *Linn. Sp. pl.* 1413. *Gr. virg.* 149. *Cat. carol.* 1. p. 23. t. 23. et p. 21. t. 21.

Loc. America borealis. *Arbor.*

Red - Oak. — Pulverem Corticis siccum stypticum vulneribus imponunt Indigenae; carnem luxuriantem demit; ad Coria depfan-
da utilissimus.

294. *QVERCVS alba* foliis oblique - pinnatifidis: sinubus angulisque obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1414. *Gr. virg.* 117. edit. n. 149. *Cat. carol.* 1. t. 21. f. 2. *Kalm. it.* 2. p. 357.

Loc. America borealis. *Arbor.*

White - Oak. — Cortex in pulv. subtilem redactus Cort. peruviano substituitur, sed nimis adstringens; utilis in Alvi fluxu obstinaci; lanas brunneo tingit.

295. *IVGLANS alba*, foliolis septenis lanceolatis ferratis: impari sessili. *Linn. Sp. pl.* 1415. *Gr. virg.* 190. ed. n. 150. *Catesb. Carol.* p. 38. t. 38.

Loc. America septentrionalis. — *Arbor.*

Hicory. — Succus vernalis acido - dulcis, saccharum praebet. Nuclei subdulces; oleum inde

295. Alia habetur Juglandis albae Varietas, *Bitter-nut* vocata, ob nucleorum amaritatem. — Huius Extra&. scrup ij. cum Oleo Chamom. dest. gtt. xij; in Colica Pictonum laudatur.

inde exprimunt Indigenae; cum aqua contusae Emulsionem dant. Radices surculorum juniorum dulces; indigenae itinerantes harum 3 - 4 comedunt, et ita famem arcent.

296. *IV GLANS nigra*, foliolis quindenis lanceolatis ferratis; exterioribus minoribus, gemmulis supraaxillaribus. *Linn. Sp. pl.* 1415. *Gr. virg.* 150. *Cat. Carol.* 1. p. 67. t. 67. — *Black Walnut*.

℞. *Juglans* foliolis lanceolatis glabris acute ferratis acuminatis, pedunculorum longitudine, fere aequalibus. *Gr. virg.* 150. — *Butternut*, Noveboracens. — *White Walnut*, Pennsylvaniae et Virginianis.

LOC. Noveboracum — Carolina. *Arbor.*

PHARM. *Juglandis nigrae* β. Cortex, Extract. gr. 6 - 12. 3β. Nuces conditae, Oleum.

QUAL. amaricans, styptica. *Trita, praestans.*
VIS: Cortic. decoct. emetica, purgans. Cort. inter. vesicans? Cort. extr. (Aloe ruricolis appellatum) purgans! Nuces juniores aceto et aromat. conditae, stypticae.

VSUS: Corticis fibris in laqueum contortis, membrum a Caudifona vulneratum, supra vulnus, circumligatur. — Obstructiones, Icterus, Vermes, Febres intermittentes, alique morbi.

Cum vitriolo atramentum nigrum praebent Cortex et Pericarpia, et lanas nigro tingunt; sine vitriolo autem brunneo.

297. *FAGVS Castanea* foliis lanceolatis acuminato-ferratis subtus nudis. *Linn Sp. pl.* 1416. *Mat.*

Mat. med. 564. *Castanea fructu dulciori.* *Gr. virg.* 151.

LOC. *Novae Angliae* — *Carolinae sylvae.* *Arbor.*

PHARM. *Castaneae fructus, Oleum, Cortex.*

QUAL. *dulcis, esculenta. Exoleta, infida, superflua.*

VIS: *flatulenta, temulentans! febrilis.*

VSVS: *Ol. Excoriatura. Coria rubro tingit Cort.*

Fructus decorticati, siccati, contriti, adfusa sufficiente quant. Aquae, Saponem usui

oeconomico aequae aptum, ac sapo communis, sistunt. Journal d' Agricult. Janv. 1782.

Succus arborum vetustiorum niger, inspissatus atramentum sistit quasi naturale. Continet partes ferreas, acidas et calcarcas. Croll.

neue Entd. 7. p. 121.

298. FAGVS *pumila* foliis lanceolato - ovatis acute serratis subtus tomentosis, amentis filiformibus nodosis. *Linn. Sp. pl.* 1416. *Gr. virg.* 150. *Cat. Carol.* 1. p. 9. t. 9.

LOC. *Noveboracum* — *Georgia.* *Arbor.*

Chinquapin. — *Fructus praecedenti dulcior; oleum largiter praebet.*

299. FAGVS *sylvatica* foliis ovatis obsolete serratis. *Linn. Sp. pl.* 1416. *Mat. med.* 565. *Gr. virg.* 150 — *Beech.*

LOC. *Canada* — *Virginia.* *Arbor.*

PHARM. *Fagi Fructus, Oleum, Cineres clavellati*

QUAL. *insipida. Exoleta, infida; fr. superflua.*

VIS: *temulentans, cephalalgica.*

VSVS:

vsvs: Corticem cum Butyro vel Oleo contusum, ad Combusturas adhibent.

300. CORYLVS *Avellana*. stipulis ovatis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1417. *Gr. virg.* 151. — *Hazel, Filberts.*

LOC. Nova Anglia — Virginia. *Frutex.*

PHARM. *Coryli* Lignum, Oleum. —

QUAL. inodora, insipida, Ol. foetida.

Exoleta, superflua.

VIS: Ol. anodyna.

VSVS: Ol. Odontalgia.

301. LIQVIDAMBAR *styraciflua*, foliis palmato-angulatis: lobis indivisis acutis. *Linn. Sp. pl.* 1418. *Mat. med.* 567. *Gr. virg.* 151. *Cold. noveb.* 228. *Cat. Car. I. p.* 68. t. 68. — *Sweetgum. Whitegum.*

LOC. Noveboracum — Mexico. *Arbor.*

PHARM. *Storacis liquidæ* Resina.

QUAL. Balsamum liquido-tenax, griseum, acre, aromaticum, fragrans. — Folia trita citrum redolent.

VIS: cephalalgica, calefaciens.

VSVS: Scabies. Gummi cum Axung. in Vngu. redact. — Cort. et gummi, in Dysenteria.

Gummi obtinetur in regionib. frigid. coctione ramulorum; in australioribus autem ex trunco vulnerato stillat.

302. LIQVIDAMBAR *asplenifolium* foliis oblongis alternatim sinuatis. *Linn. Sp. pl.* 1418. *Amoen. acad.* 4. p. 522.

Myrica. *Gr. virg.* 155. *Cold. noveb.* 224.

LOC. Nova Anglia — Virginia.

Frutex.

Sweet-

Sweetfern. — Infusum foliorum in rhachitide, debilitate febrili, utile. — Radix masticata sanguinem fistit. *Colden.*

MONADELPHIA.

303. PINVS *Strobus*, foliis quinis margine scabris, cortice laevi. *Linn. Sp. pl.* 1419. *Gr. virg.* 152. *Cold. noveb.* 229.

LOC. Canada — Virginia. *Arbor.*

White Pine — *Lord Weymouth's Pine* — Decoct. Turionum alvum laxat; Conorum ad Rheumatismos laudatur.

304. PINVS *Taeda*, foliis trinis. *Linn. Sp. pl.* 1419. cum Varietatibus: *Pitch pine* — *Black-pine* — *Swamp-pine* — *Yellowpine.*

LOC. Americae borealis, (praecipue maritimae) sterilia. *Arbor.*

PHARM. *Pini* Resina, Pix, Oleum picis. *Terebinthina* communis, cocta, Spiritus, Oleum.

QUAL. resinosa. *Trita, praestans.*

VIS: diuretica, mundificans.

VSVS: Scorbutus.

305. PINVS *Laricina*, foliis fasciculatis acuminatis fetaceis cinereis. *Gr. virg.* 153. *Düroi barbk. baumz.* 1. p. 83. — *Tamarac.* *Pensylvan.*

LOC. Noveboraci — Virginiae Montium paludes. *Arbor.*

PHARM. *Laricis* Cortex, Resina, Gummi?

QUAL. resinosa, gummosa? (*Pini Laricis.* *Linn. Mat. med.* 570?)

VIS: diuretica; Cort. decoct.

VSVS: Oedema, Cachexia. — Equis labore exhaustis (overdone) quoque propinatur.

306. PINVS *balsamea* foliis solitariis subemarginatis: subtus linea duplici punctata. *Linn.*

Sp. pl. 1421. *Gr. virg.* 152. *Mill. dict. n.* 3.

LOC. Canada — Virginia. *Arbor.*

Balm of Gilead - fir. — Folia contrita odorem balsamicum spirant. Inde obtinetur Balsamum canadense Officin. vel Terebinthina, suaveolens, quae pro balsamo Gileadenfi in Anglia saepe venditur: Qual. et Viribus cum Terebinthina Veneta convenit.

PINVS *canadensis* foliis solitariis linearibus obtusiusculis submembranaceis. *Linn. Sp. pl.* 1421.

Ex hac praecipue specie Cerevisiam Canadenses et Extractum praeparant; licet et aliae species eodem scopo inserviant.

307. THVIA *occidentalis*, strobilis laevibus, squamis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 1421. *Kalm. it.* 3. p. 289. *Gr. virg.* 153.

LOC. Canadae — Virginiae uliginosa, saxosa. Ex foliis tritis unguentum ad dolores rheumaticos paratur. Decoct. in Tussi et Febribus, in Cacochymia scorbutica, Rheumatismis etc. utile. *Rudolph. in Balding. n. Magaz. VIII* 3. p. 235. Aquam destillatam in hydropo laudat *Boerhaave*.

308. CVPRESSVS *disticha*, foliis distichis patentibus. *Linn. Sp. pl.* 1422. *Gr. virg.* 153. *Cat. Carol. I. t.* II.

LOC. Virginiae — Floridae humida. *Arbor.* Nuces balsamum suaveolens continent. Decoctum strobilorum vi gaudet diuretica, carminativa, pellente.

309. *CYPRESSVS thyoides*, foliis imbricatis, frondibus ancipitibus. *Linn. Sp. pl.* 1422. *Kalm. it.* 2. p. 175 et 3. p. 114. *Mill. dict.* n 5. *Loc.* Pennsylvaniae — Canadae subhumida *Arbor.* *White-Cedar.* — Infusum ligni raspati ad appetitum ciendum laudatur. Nuces subfragrantes.

310. *CROTON Castearilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis subtus tomentosis, caule arboreo. *Linn. Sp. pl.* 1424. *Ricinoides elaeagni folio.* *Cat. Carol.* 2. p. 46. t. 46. *Loc.* Florida, Bahama. *Arbor.* *PHARM. Castearillae Cortex, Effentia.* *QVAL.* acris, amara, fragrans, fumo moschato. *Trita, eximia.* *vis:* tonica, sub-eccoprotica, thoracica. *vsus:* Febr. Exacerbantes, Tertianae, Diarrhoea febrilis.

311. *IATROPIA urens* foliis palmatis dentatis aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 1429. *Gr. virg.* 154. *Loc.* Virginia — Florida. *Herbacca, subfrutescens.* *QVAL.* lactescens, urens tactu. *vis:* forte Iatrophae Curcas vel Ricini Majoris. *Linn. Mat. med.* 578.

312. *RICINVS communis* foliis peltatis subpalmatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 1430. *Linn. Mat. med.* 579. *Mill. ic.* 219. *Gr. virg.* 153. *Loc.* Virginia — Florida. *PHARM. Ricini vulgaris, (Cataputiae Majoris) Semina. gr. XXV. Palmae Christi Oleum.*

QUAL. acris, amara. *Exoleta, cauta.*

VIS: draſtica, inflammatoria, gaſtriticans, anthelminthica! Ol. laxans.

VSVS: Iliaca, Colica pictonum, Nephritica, Taenia.

Hura crepitans. Linn. Sp. pl. 1431.

Providentia. Mexico. — *Sand-boxtree.*
Sem. emetica, draſtica.

313. HIPPOMANE *Mancinella* foliis ovatis ferratis. Linn. Sp. pl. 1431.

Mancanilla. Cat. Carol. I. 95. t. 95.

LOC. Georgia, Florida. — Succus lacteus, venenosus, urens, vesicans, inflammans, depilatorius.

214. STILLINGIA *sylvatica.* Linn. Syst. nat. p. 637.

LOC. Carolinae Pineta.

VIS: in Syphilitide specifica habetur. Dr. Garden.

SYNGENESIA.

315. CUCURBITA *lagenaria* foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis. Linn. Sp. pl. 1434. Mat. med. 581.

LOC. Americae culta. *Annua.*

PHARM. *Cucurbitae* Semina.

QUAL. subdulcis.

VIS: edulcorans, refrigerans.

VSVS: Febres putridae, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.

COMP. Sem. IV. frigida majora; Species diatrageacanthae.

Schoepfi Mat. med.

K

Cucur

CVCVRBITA *Citrullus foliis multipartitis.* Linn.

Sp. pl. 1435. Mat. med. 582. — *Water - Melons.*
 LOC. Americae culta. *Annua.*

PHARM. *Citrulli Semina.*

QUAL. VIS: VSVS: COMP. antecedentis.

CVCVMIS *Melo foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis.* Linn. Sp. pl. 1436. Mat. med. 584. — *Musk - Melons.*

LOC. Americae culta. *Annua.*

PHARM. *Melonis Semina, excorticata.*

QUAL. VIS: VSVS: COMP. antecedentis.

CVCVMIS *Jativus foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris.* Linn. Sp. pl. 1437. Mat. med. 585. — *Cow-cumbers.*

LOC. Americae culta. *Annua.*

PHARM. *Cucumeris Fructus, Semina.*

QUAL. aquoso-mucilaginea.

VIS: nutriens, refrigerans.

VSVS: Phthifis! Fr.


316. SICYOS *angulata, foliis angulatis.* Linn. Sp. pl. 1439.

Sicyos foliis ternatis. Gr. virg. 154.

LOC. Canada — Mexico. *Annua.*

Wild Cowcumber — *Semina amara; purgantia?*





CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

317. SALIX — fol. petiolatis lanceolatis acutis
tenuissime ferratis, supra pubescent. viridibus,
subtus tomentosis glaucis.

Yellow Willow — Cortex et radices ama-
ra; infusum spirituosum ruricolis familiare,
loco Cortic. peruv.

318. SALIX — fol. anguste lanceolatis, utrin-
que glabris, ferratis, breviter petiolatis.

Swamp-Willow — Cortice febres intermitten-
tes debellantur.

T E T R A N D R I A.

319. VISCUM *rubrum*, foliis lanceolatis obtu-
sis, spicis lateralibus. *Linn. Sp. pl.* 1451. *Cat.*
car. 2. p. 81. t. 81.

Viscum purpureum foliis obovatis racemis late-
ralibus. *Linn. Sp. pl.* 1451. *Cat. Carol.* 2. p. 95.
t. 95. *Gr. virg.* 154.

Loc. Pennsylvaniae — Georgiae arbores.

Frutices, parasitici

PHARM. *Visci* Lignum, Oleum.

QUAL. mucilaginosa.

VIS: inviscans, lubricans.

VSVS: *Visci albi.* *L Mat. med.* 588. Epilepsia,
Vertigo, Pleuritis, Dysenteria.

320. MYRICA Gale, foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso. *Linn. Sp. pl.* 1453. *Mat. med.* 589.

Myrica cerifera, foliis lanceolatis subserratis, caule arborecente. *Linn. Sp. pl.* 1453. *Amoen. acad.* 4. p. 533. *Kalm. it.* 2. p. 312. *Gr. virg.* 120. *ed. n.* 155. *Cat. Carol.* 1. p. 69. et p. 13. t. 13. — *Candle-berry bush.*

LOC. *Novae Angliae* — *Georgiae* ulig. *Frutices.*
PHARM. *Myrti brabanticae* Folia.

QUAL. amara, nidorosa, luteo-tinctoria, cerifera. *Praefans.*

VIS: narcotica, phantastica, cephalalgica, exanthematica.

VSVS: Scabies! Pediculi. Arthritis, Febres suppressae, in *Russia.* *Balding. N. Mag.* 8. B.

Cera viridis saponacea, vulneraria. Radix ad Odontalgiam — Gemmae flavo tingunt.

PENTANDRIA.

321. ZANTHOXYLUM *Clava herculis*, foliis pinnatis. *Linn. Sp. pl.* 1455. *Amoen. acad.* t. 3. p. 16. *Gron. virg. ed. n.* p. 47. *Catesb. carol.* 1. p. 26. t. 26. — *Toothach. Pellitory.*

LOC. *Terra Mariana* — *Florida.* *Arbor.*

PHARM. *Zanthoxyli* Cortex, Semina, .

QUAL. acris, penetrans, aromatica. *Baccae*
Oleum fragrans, Citrino simile continent. —
Folia odore *Aurantiorum.*

VIS: sialagoga, adstringens, pellens.

VSVS: Odontalgia.

SPINACIA *oleracea* fructibus sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 1456. *Mat. med.* 593. — *Spinage.*

LOC.

LOC. Horti.

Annua.

PHARM. *Spinaciae* Herba, Semina.

QUAL. aquosa, oleracea, insipida. *Superflua.*

VIS: diluens, humectans, eccoprotica.

VSVS: cibarius.

322. CANNABIS *sativa*. Linn. Sp. pl. 1457.

Mat. med. 594. — *Hemp*.

LOC. Agri.

Annua.

PHARM. *Cannabis* Semina, Oleum.

QUAL. virofa.

VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, repellens.

VSVS: Gonorrhoea, Leucorrhoea, Icterus.

323. HUMULUS *Lupulus*. Linn. Sp. pl. 1457.

Mat. med. 595.

Lupulus sylvestris. Gr. virg. ed. n. 155. — *Hops*.

LOC. Agri. — *sylvestris* in Virginia. *Perennis*.

PHARM. *Lupuli* Coni.

QUAL. amara, nidorosa.

VIS: tonica, narcotica, phantastica, anodyna.

VSVS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia. Sem. Obstipatio.

HEXANDRIA.

324. SMILAX *Sarsaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuso-mucronatis trinerviis. Linn. Sp. pl. 1459. Mat. med. 597. Gr. virg. 120. ed. n. 156.

LOC. Noveboracum — Mexico. *Perennis*.

PHARM. *Sarsae parillae* Radix.

QUAL. sicca, amaricans, glutinosa. *Trita, praestans*.

VIS: diuretica, sudorifera, purificans.

VSVS: Syphilis, Arthritis, Cachexia.

COMP. Decocta lignorum.

325. *SMILAX Pseudo-China*, caule inermi tereti, foliis inermibus; caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis quinquenerviis. *Linn. Sp. pl.* 1461. *Gr. virg.* 193. *ed. n.* 156. — *China-root.*

LOC. Nova-Anglia — Florida.

Perennis.

PHARM. *Pseudo-Chinae Radix.*

QUAL. sicca, inodora.

VIS: **VSVS:** prioris.

SMILAX tannoides. *Gr. virg.* 256. *Cat. carol.* 1. p. 52. t. 52. et *laurifolia.* *Cat. carol.* 1. p. 15. t. 15. quoque sub nomine *China-root*, a nonnullis in usum trahuntur varium; Cerevisiam inde parant; nigro et caeruleo tingunt baccis; utramque prioribus substituant.

OCTANDRIA.

326. *POPULVS nigra* foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 1464. *Mat. med.* 599.

Gr. virg. 157. *Mill. dict. n.* 3. — *Black Poplar.*

LOC. Virginia.

Arbor.

PHARM. *Populi oculi* (gemmae rectius.)

QUAL. resinosa.

Exoleta.

VIS: obtundens, emolliens, soporifera.

VSVS: Diarrhoea, Dysenteria! Ambustura, Arthritis.

COMP. Unguent. populeum.

327. POPVLVS *balsamifera* foliis ovatis ferratis subtus albidis, stipulis resinosis. *Linn. Sp. pl.* 1464. *Mat. med.* 600.

Populus nigra folio maximo, gemmis balsamum odoratissimum fundentibus. *Cat. car.* 1. t. 34. p. 34.

LOC. Noveboracum? — Carolina. *Arbor.*

PHARM. *Tacamahaca*, vulgo.

QVAL. Gummi - resina, flavescent, fragrans.

VIS:

VSVS:

MONADELPHIA.

328. IVNIPERVS *virginiana*, foliis ternis basi adnatis: junioribus imbricatis, senioribus patulis. *Linn. Sp. pl.* 1471. *Gr. virg. ed. n.* 157. *Kalm. it.* 3. p. 119. — *Red Cedar.*

LOC. Nova Anglia — Georgia. *Arbor.*

PHARM. *Iuniperi* Lignum, Baccae; Resina.

QVAL. *Bacca* atro - caerulea pulvere resinoso albicante tecta, aromatica.

VIS; pellens, diuretica, mundificans.

VSVS:

329. TAXVS *baccata*, foliis approximatis. *Linn. Sp. pl.* 1472. Canada. — Baccae suspectae sunt; folia pecoribus nocere confirmatum est.



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

330. *CELTIS occidentalis*, foliis oblique ovatis ferratis acuminatis. *Linn. Sp. pl.* 1478. *Gr. virg.* 158. Baccae ad dysenteriam commendantur.

331. *VERATRUM album* racemo supradecomposito, corollis erectis. *Linn. Sp. pl.* 1479. *Mat. med.* 610.

LOC. Noveboracum, prope Kypfies-bay. *Perennis.*
PHARM. *Hellebori albi* Radix gr. VII.

QUAL. acris, nauseosa.

VIS: drastica, emetica, sternutatoria!

VSVS: Cophosis, Mania, Epilepsia, Quartana, Scabies, Phthiriasis.

Ovibus, Anseribus, lethifera, noxia.

332. *VERATRUM luteum*, racemo simplicissimo, foliis sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 1479. *Amoen. acad.* 4. p. 521. *Gr. virg. ed. n.* 158.

LOC. Canada — Virginia.

Rattle Snake-Root. Eenborns horn. — Radix magna, tuberosa, contorta, masticata nauseam movens. *Clayt.* Sialagoga. Apud nostrates in usu est. *Colden.*

VERATRUM Sabadilla? *L. Mat. med.* 611. — Mexico.

333. ATRI-

333. *ATRIPLEX Halimus*, caule fruticoso, foliis deltoidibus integris. *Linn. Sp. pl.* 1491. *Gr. virg.* 185. *ed. n.* 160. *Mill. dict. n.* 2.

LOC. Virginiae etc. maritima. *Perennis.*

Turiones edules. Folia anodyna habentur; cum amylo vel pane triticeo cocta, cataplasmatibus forma, in Podagra adhibentur.

334. *ATRIPLEX laciniata*, caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis subtus argenteis. *Linn. Sp. pl.* 1494. *Gr. virg.* 120. *ed. n.* 160.

LOC. Novae Angliae — Virginiae maritima.

Annua.

QUAL. Atriplic. Sativae. *Mat. med.* 615. aquosa, oleracea, insipida. *Exoleta, infida.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans. —

Clusia rosea. *Linn. Sp. pl.* 1495.

LOC. Bahama.

Gambogia quibusdam, ob succum spissum flavum in fructu contentum, e quo gummirefina, Gummi guttae viribus similis, obtineri dicitur. Alii perhibent, Balf. Tolutanum ex eo parari, vel eo adulterari.

335. *ACER saccharinum*, foliis quinquepartito-palmatis acuminato-dentatis. *Linn. Sp. pl.* 1496. *Gr. virg. ed. n.* 161.

LOC. Canada — Virginia. *Arbor.*

Sugar-Maple. *Rin-trä* Suecis in Pennsylvania. — Succus vernalis copiosus Saccharum praebet; — idem obtinetur quoque ex

ACERE Negundo. *L. Sp. pl.* 1497. — *White Ash.* et

ACERE rubro. *Linn. Sp. pl.* 1496. *Kalm. it.* 2. p. 288. *Cold. noveb.* 85. *Cat. Carol.* 1.

t. 62. — *Red Maple*. Huius cortex, lintea et lanas brunneo colore tingit.

DIOECIA.

336. *GLEDITSIA triacanthos* spinis triplicibus axillaribus. *Linn. Sp. pl.* 1509. *Gr. virg.* 161. *Mill. dict. n.* 2. *Cat. Carol. I.* t. 43.

LOC. Noveboracum — Florida. *Arbor.*

Honey - Locust. — Siliquae pulpam dulcem continent; unde Mulsu praeparatur. Hiemali tempore legumina pecori grata. *Clayt.*

337. *FRAXINUS americana* foliolis integerimis, petiolis teretibus. *Linn. Sp. pl.* 1510. *Gr. virg.* 161. *Catesb. carol. I.* t. 80.

Fraxinus excelsior, foliolis ferratis, floribus apetalis. *Kalm. Linn. Mat. med.* 620.

LOC. Noveboracum — Virginia. *Arbor.*

PHARM. *Fraxini* Lignum, Θ , Cortex, Folia, Semina.

QUAL. Cort. amara. Sem. aromatica, singularis. VIS: adstringens. Sem. ficans. Sal. diuretica. VSVS: Haemorrhagia, Tertianæ. (Fol. Morsura Serpent.) Sem. Obesitas.

338. *DIOSPYROS virginiana* foliorum paginis concoloribus. *Linn. Sp. pl.* 1510. *Kalm. it.* 2. p. 200, 255, 457. *Gr. virg.* 156. ed. n. 162. — *Perfimon. Guaiacana. Cat. carol. 2.* p. 76. t. 76.

LOC. Noveboracum — Georgia. *Arbor.*

PHARM. *Diospyri* Radix, Cortex, Gummi, Fructus. —

QUAL. Cort. adstringens. Fr. austero - dulcis, mucilaginosus.

VIS: styptica.

VSVS:

vsvs: Haemorrhagia, Mictus cruentus!

Cerevisia et Spiritus ardens inde obtinentur; vid.
Americ. Philosoph. Transact. vol. I.

NYSSA *aquatica*. Linn. Sp. pl. 1511. pedunculis multifloris. Gr. virg. 121. ed. n. 162. Cat. carol. 1. p. 60. t. 60. et p. 41. t. 41. — Pedunculis unifloris. Gr. virg. *ibid.*

Loc. Noveboraci — Georgiae aquosa. *Arbor. Tupelo-tree. Black-Gum.* — Fructus amari-
cans. Cortex, radicis praecipue, immo et
lignum, molle ad obturanda vitra inservit.

339. PANAX *quinquefolium*, foliis ternis quina-
tis. Linn. Sp. pl. 1512. Mat. med. 623. Gr.
virg. 147. ed. n. 162. Kalm. it. 3. p. 334. Cat.
carol. 3. t. 16.

Loc. Canadae — Virginiae umbrosa montium.
Perennis.

PHARM. *Ginseng* Radix. 3j.

QUAL. aromatica, dulcis.

VIS: cordialis, analeptica, edulcorans, expe-
ctorans.

vsvs: Atecnia, Debilitas, Marasmus.

TRIOECIA.

FICUS *Carica* foliis palmatis. Linn. Sp. pl.
1513. Mat. med. 624. — *Fig-tree.*

Loc. Carolina — Florida. *Arbor, cicur, culta.*

PHARM. *Caricae* pingues.

QUAL. dulcis, mucilaginosus, lactescens.

Trita, eximia.

VIS: nutriens, impinguans, obtundens, lubri-
cans, emolliens, maturans, hepatica! diu-
retica, eccoprotica, exanthematica.

vsvs:

vsvs: Tussis, Colica saturnina, Exanthemata,
Bubo, Anthrax, Dyitocia, Obstipatio;
nocet Scabiosis et Gingivis ulcerosis.
COMP. Enemata.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

340. *EQVISETVM arvense*, scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Linn. Sp. pl.* 1516. *Mat. med.* 625. *Gr. virg.* 123. *ed. n.* 163.
LOC. Novebor. — Virginiae pascua. *Perennis.*
PHARM. *Equiseti* Herba.
QVAL. ficca. *Exoleta, eximia.*
VIS: adstringens! — diuretica!
vsvs: Haematuria! Gonorrhoea benigna, Profluvia, Phthisis.
341. *ADIANTVM pedatum*, frondibus pedatis, foliolis pinnatis, pinnis antice gibbis incisifructificantibus. *Linn. Sp. pl.* 1557. *Kalm. it.* 3. p. 338. *Gron. virg.* 123. *ed. n.* 167. *Cold. noveb.* 236.
LOC. Canada — Virginia. *Perennis.*
PHARM. *Adianti pedati* (*Capill. veneris canad.*) Herba.
QVAL. (*Capilli Veneris*, *Mat. med.* 633.) ficca, subodorata.
VIS: corroborans, diuretica.
vsvs: Obstructio viscerum. Ad omnes Tusses valet. *Clayt.*

M V S C I.

342. LYCOPODIVM *Selago*, foliis sparsis octofariis caule erecto dichotomo fastigiato, floribus sparsis. *Linn. Sp. pl.* 1565. *Mat. med.* 635. *Gr. virg. ed. n.* 168.

LOC. Virginia.

Perennis.

PHARM. *Musci erecti* Herba.

QUAL. virulenta.

Exoleta, heroica.

VIS: draastica, abortiva, phthiriaca.

VSVS: Hydrops, Pediculi.

343. POLYTRICHVM *commune*, caule simplici; anthera parallelepiped. *Linn. Sp. pl.* 1573. *Mat. med.* 636. *Gr. virg. ed. n.* 168.

LOC. Novae - Angliae - Virginiae arida. *Perennis.*

PHARM. *Adianti aurei* Herba.

QUAL. cruda.

Exoleta, inutilis.

VSVS: Pleuritis. (de viribus conferend. *Plum. filic. Am. p. 2. praef. Clayton.*)

HYPNVVM *castrense* — masticatum et vulneri a Morsura Serpentis impositum, utile esse mihi indicatum est.

A L G A E.

344. LICHEN *pulmonarius*, foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunofus, subtus tomentosus. *Linn. Sp. pl.* 1612. *Mat. med.* 639.

LOC. Novae Caesareae arbores.

Parasiticus.

PHARM. *Pulmonariae arboreae* Herba., *Praestans.*

QUAL. mucilaginea, amaricans.

VIS: tonica, nutriens, thoracica.

VSVS: Tussis, Icterus.

345. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta

pelta marginali adscendente. *Linn. Sp. pl.* 1616.

Mat. med. 641. *Gr. virg. ed. n.* 178.

LOC. Americae septentr. sylvae lapidesque.

PHARM. *Musci canini* Herba.

QVAL. tetra, mephitica. *Inusitata.*

VIS: mundificans, pellens.

VSVS: Hydrophobia! Rabies!

COMP. Pulv. antilyssus. Θ iv.

346. LICHEN *cocciferus*, scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico; tuberculis coccineis. *Linn. Sp. pl.* 1618. *Mat. med.* 642. *Gr. virg. ed. n.* 178.

LOC. Americae sylvae.

PHARM. *Musci pyxidati* Herba.

QVAL. ficca.

VSVS: Tussis convulsiva.

347. LICHEN *plicatus* filamentosus pendulus: ramis implexis, scutellis radiatis. *Linn. Sp. pl.* 1622. *Mat. med.* 644. *Gr. virg. ed. n.* 173.

LOC. Americae sylvae. *Parasiticus.*

PHARM. *Musci arborei* Herba.

QVAL. ficca.

VIS: adstringens.

VSVS: Excoriatura, Haemorrhagia, Hernia umbilicalis.

348. FV CVS *saccharinus* caule tereti brevissimo, Folio maximo ensiformi subsimplici. *Sp. pl.* 1630.

LOC. Maris atlantici litora. Esculentus.

349. FV CVS *natans* caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis-serratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis. *L. Sp. pl.* 1628.

LOC. in Pelago libere natans.

Gulfweed. — Pulvis parturientibus datur. *Kalm. 2.*
FVNGI

F V N G I.

349. AGARICVS *coriaceus* Iuglandis. Ad nodos Iuglandis albae, intra lignum nascitur. Fomes ad ignem citissime concipiendum. *Punck* hic vulgo dictus. *Gr. virg. ed. n. 175.*
 vis: Sanguinem fistens.
 vsus: Chirurgicus.

AGARICVS substantiae tenellae gelatinae, auriculae forma. *Iews-ear.* *Gr. virg. ed. n. 175.*
 An *Peziza Auricula.* *Linn. Mat. med. 656?*

350. LYCOPERDON *Tuber* globosum solidum muricatum radice destitutum. *Linn. Sp. pl. 1655. Mat. med. 647. Gr. virg. ed. n. 176.*
 Loc. *Novae Caesareae — Virginiae sylvae. Subterrestris.*

PHARM. *Boleti Cervini.*

QUAL. hircina.

Exoleta, dubia.

vis: aphrodisiaca, flatulenta.

vsus: Atecnia.

Ad panem conficiendum Indi utuntur hoc fungo, vulgo *Tuckahoo.* *Clayt.*

351. LYCOPERDON *Bovista* subrotundum lacerato-dehiscens. *Linn. Sp. pl. 1653. Mat. med. 648.*

Lycoperdon maximum dehiscens, pulvere repletum. *Gr. virg. 176.*

Loc. *Noveboraci — Virginiae campi, sylvae.*

PHARM. *Crepitus Lupi.*

QUAL. farinosa, styptica, nigrans. *Trita, eximia.*

vis: adstringens, obstipans, absorbens, incrassans, gastritica, ophthalmica.

vsus: Amputatio. Haemorrhagia! Haemorrhoids, Ulcera, Intertrigo.



OBSCURAE.

352. *Old. Roberts Root.* Planta, in Turkey Creeck Settlement, Pennsylvaniae, mihi visa, non autem flores.

Radix fibrosa, fibrillis tenuibus albis. Folia radicalia, petiolis canaliculatis, glabris, ob-ovata vel subrotunda, obtusa, crenata, glabra, long. poll. $1\frac{3}{4}$ lat. $1\frac{1}{2}$. Mense Octobri flores plures parvos flavos in caule sesquipedali proferre dicitur. Amat Querceta sicca, nec copiosa invenitur.

Rad. et fol. sapore herbaceo amaricante; pulverifata externe applicata Ulcera aliaque cutis vitia sanat; eodem tempore autem infusum plantae bibendum est. Framboesiam (the Yaws) quoque curare dicitur.

353. *Butterfly-root; Pleurisy-root.* — Hoc nomine in Terra Mariana Radix quaedam insignitur, alba, crassitie digiti auricularis, cuius virtutes incolae in Pleuritide, aliisque morbis febrilibus, magni faciunt. Plantam non vidi; nomen vero, illam ad Diadelphiam pertinere, suadet. — Sapor est mucilagineo-dulcescens, amaricans.

In Pennsylvania nomine *Pleurisy-root* Radix Asclepiadis tuberosae venit, cujus particula, dimidium pollicem magnitudine aequans, decocta pro remedio certissimo adversus Pleuritidem habetur, ut nuper e literis Ven. *Muhlenbergii* didici.



MATERIA MEDICA

REGNI ANIMALIS.

CLASSIS I. MAMMALIA.

1. HOMO *Sapiens*.

Hominis, Cranium, Offa, Axungia. *L. m. m. 1.* —
Superstitiosa, exoleta.

2. ELEPHAS.

Ebur fossile, ad fluvium Ohio, et alibi. *L. m. m. 2.*

3. TRICHECHVS *Manatus*. *L. Syst. Nat. 49. Schreb. Mammal. Tab. LXXX.*

Manati Lapis. (os petrosum.) *L. m. m. 3.*

4. CANIS *familiaris*. *L. Syst. nat. 56.*

Canis Axungia, Album graecum. *L. m. m. 4.*

5. CANIS *Lupus*. *L. Syst. nat. 58. Schreb. Mammal. Tab. XXXVIII.*

Lupi, Dens, Hepar, Axungia. *L. m. m. 5.*

6. α) CANIS *Cinereo - argenteus* *Briff. — Schreb. Tab. XCII. A.*

β) CANIS *Virginianus*. *Schreb. Tab. XCII. β. Grey-Fox. Catesb. Tom. 2. pag. 78.*

Vulpis Pulmones praep. Axungia. *L. m. m. 6.*

7. VIVERRA *Putorius*. *L. Syst. Nat. 64. — Schreb. Tab. CXXII. pag. 449. Skunck. Pole-Cat. Catesby. Tom. 2. pag. 62.*

Schoepfii mat. med.

L

Tol-

Folliculus inter anum et genitalia, materiam oleosam et mephiticam continet, cuius vires anti-hystericas commendat Dr. Mutis *).

8. VRSVS *Arctos* Linn. *niger*. *Syst. nat.* 69. ? *americanus* Penn. *hist.* 2. p. 286. Schreb. p. 512. *Bear*.
Vrsi Fel inspissatum, Axungia. L. m. m. 9.

9. VRSVS *Lotor*. L. *Syst. nat.* p. 70. Schreb. *Tab. CXLIII. Raccoon*.
Lotoris Axungia.

10. LEVVS *americanus*, *Naturf.* 20. p. 32. Penn. *hist.* 2. p. 372. n. 243.
Leporis Tali. L. m. m. II. Superflua.

11. CASTOR *Fiber*. L. *Syst. nat.* 78. Schreb. *Tab. CLXXV. Beaver*. *Cat. Carol App.* p. 29.
Castoreum optimum, siccatum, Pulvis, Extractum, Tinctura. Axungia follicularis. L. m. m. 12.

12. CASTOR *Zibethicus*. Linn. *Syst. nat.* 79. Schreb. *Tab. CLXXVI. Musk Rat. Ondathra*.
Materia oleoso-mucosa, ambrosiaca in glandulis inguinalibus secreta, Vires Castoreo analogas, sed debiliores, habere dicitur.

13. MVS *Monax*. L. *Syst. Nat.* 81. *Arctomys Monax*. Schreb. *Tab. CCVIII*.
Ground-hog. Bahama Coney. *Cat. Carol. II. t. 79. et App p. XXVIII*.
Monacis Axungia.

14. CERVVS *Alces*. L. *Syst. nat.* 92. Schreb. *Tab. CCXLVI. Moose or Elk. Orignal*.
Alcis Cornu, Vngula. L. m. m. 15.

15. CER-

*) It is considered as conducive to clear the head and to raise the spirit. *Carver's Travels. pag. 422.*

15. CERVVS *americanus*. *Zimmerm. zool.* 2. p. 129.
 Virginian Deer. *Pennant. Hist.* 1. p. 104.
Cervi Cornu crudum, raspatum, praeparatum. Vstum,
 Sal, Spiritus, Oleum, Gelatina. Sevum. *L. m.*
m. 16.
16. CERVVS *Tarandus*. *Linn. Syst. nat.* 93. *Schreb.*
Tab. CCXLVIII. Carabou.
 Vfus prioris. *L. m. m.* 11.
17. CAPRA *Hircus*. *L. Syst. nat.* 94.
Hirci Sanguis, Sevum. *L. m. m.* 18.
18. BOS *Taurus*. *L. Syst. nat.* 98. domesticus.
 Bos Bison. *L. Syst. nat.* 99. *Buffalo.*
Bovis Medulla. Fel inspissatum. —
 Lactis Butyrum, Caseus, Serum. *L. m. m.* 20.
19. SVS *Scrofa*. *L. Syst. nat.* 102.
Porci Axungia. *L. m. m.* 23.
20. MONODON *Monoceros*. *L. Syst. nat.* 105. *Narhwal.*
Unicornu crudum, raspatum, praeparatum. *L. m.*
m. 24.
21. PHYSETER *macrocephalus*. *L. Syst. nat.* 107. *Sper-*
maceti - whale.
Ceti Sperma. *L. m. m.* 26.

CLASSIS II. AVES.

22. ANAS *Anser*. *L. Syst. nat.* 197.
Anseris (domestici) Axungia. *L. m. m.* 28.
23. ANAS *Boschas*. *L. Syst. nat.* 205.
Anatis (domestici) Axungia. *L. m. m.* 29.
24. PHASIANVS *Gallus*. *L. Syst. nat.* 270.
Gallinae Ovorum Testae praeparatae, calcinatae. Vi-
 telli. Oleum, Axungia. *L. m. m.* 32.

CLASSIS III. AMPHIBIA.

25. α) TESTUDO imbricata. L. Syst. nat. 350. Hawks-bill Turtle.
 β) TESTUDO Mydas. ibid. Green Turtle.
 γ) TESTUDO Caretta. L. Syst. 351. Loggerhead.
 Caro β) (viridescens) esculenta, restaurans.
26. RANA ocellata. L. Syst. nat. 356. Bull-frog.
 Catesb. Carol. 2. p. 72. Ranarum Sperma. L. m. m. 36.
27. LACERTA.
 Lacertae cuiusdam, Americanae, vires antisyphiliticas nuperrime laudavit, Don John Florès, D. Med. etc. vid. Eiusdem libellus: *Spécifique simple et aisé nouvellement decouvert dans le Royaume de Guatimala en Amerique, pour l'entière et sûre guerison des chancres, de la lèpre et généralement de tout ce qui a rapport aux maladies vénériennes*. Varias Lacertarum Species, etiam Europaeas, (secundum experimenta in Hispania capta), easdem possidere vires creditur. Lacertam Iguanam tamen Syphiliticis noxiam esse, monet Linné.
28. CROTALVS horridus. L. Syst. nat. 372. Rattle Snake.
 Crotali Bilis, cum Creta in Bolos formata, usui medico inservit. Carver's Travels p. 452. Caro efficcata; restaurans. ibid.
29. ACIPENSER Sturio. L. Syst. nat. 403. Sturgeon.
 Colla Piscium. Coctum gluten ex pinnis, intestinis, corio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum. Linn. m. m. 41.

CLASSIS IV. PISCES.

30. PERCA. Species in America Variæ.

Percarum Lapides. Superflua. L. m. m. 42.

31. ESOX *Lucius*. L. *Syst. nat.* 516.

Lucii Mandibulae, Axungia. L. m. m. 43.

CLASSIS V. INSECTA.

32. MELOE *majalis*. L. *Syst. nat.* 679.

An Mel. *velicatorio* (Cantharid. officinal.) substituentus.

33. COCCVS ?

34. COCCVS *Cacti coccinelliferi*. *Syst. nat.* 942.

In *Cactis* *Opuntiis* variis Americes.

Coccionellæ. L. m. m. 48.

35. CYNIPS *Rosæ*. L. *Syst. nat.* 917. *Bedeguar*.

Fungus Rosarum. Superstitiosa. L. m. m. 50.

36. CYNIPS *Quercus* ? — *Gallæ*. L. m. m. 51.

Omnes *Quercus* Species et variæ illarum partes, *Gallis* variis obsiduntur.

37. APIS *mellifica*. L. *Syst. nat.* 955.

Mel, *Cera*, *Propolis*. L. m. m. 52.

38. FORMICA *rufa*. L. *Syst. nat.* 962. in America Septentr. *Kalm*.

Formicarum Sal, Oleum, Spiritus. L. m. m. 53.

L 3

39. CAN-

*) *Cantharidum* officinalium loco, forte *Rhois Toxicodendri*, radicans et Vernicis, vel *Hippomanes Mancinellæ succi*, cautus usus, commendandus?

39. CANCER *Gammarus*; *Carcinus*. *L. Syst. nat.* 1050.
et aliae plures species.

Cancrorum Chelae, Lapides. *L. m. m.* 56. 57.

40. ONISCUS *Afellus*? *Millepedes*? *L. m. m.* 58.

CLASSIS VI. VERMES.

41. LUMBRICUS *terrestris*. *L. Syst. nat.* 1076.

Lumbrici Pulvis, Sal, Spiritus, Oleum. *L. m. m.* 59.

42. HIRUDO *medicinalis*?

43. SEPIA *officinalis*. *L. Syst. nat.* 1095.


Sepiae os. *L. m. m.* 61.


44. OSTREA *edulis*. *L. Syst. nat.* 1148. (Testa Americanis oblonga.)

Conchae, citratae. *L. m. m.* 62.

45. *Madrepora*. —

ISIDIS, SPONGIAE, CORALLINAE — Species variae in Oceano Americano.





MATERIA MEDICA

REGNI MINERALIS.

1. MARMOR rude. *L. Syst. nat.* 41.
Calx viva, lota, Aqua. *L. m. m.* 666.
2. GYPSVM usuale. *L. Syst. nat.* 45. Pensilvania?
Nova Scotia.
Gypsum praeparatum *L. m. m.* 667.
3. TALCVM Rubrica. *L. Syst. nat.* 57. Pensilvania.
Rubrica fabrilis. *L. m. m.* 670.
4. TALCVM Smectis. *L. Syst. nat.* 52.
Talcum viride. *L. m. m.* 671.
5. TALCVM Nephriticus. *L. Syst. nat.* 53. America?
Linn.
Lapis nephriticus. *L. m. m.* 671.
6. AMIANTVS Asbestus, et plumosus. *L. Syst. nat.* 55.
Alumen plumosum. *L. m. m.* 673.
7. MICA talcosa?
8. SILEX cretaceus. *L. Syst. nat.* 67.
Silex combustus. *L. m. m.* 675.
9. NITRVM nativum. *L. Syst. nat.* 84.
Nitrum commune. *L. m. m.* 677.
10. NITRVM CrySTALLUS montana. *L. Syst. nat.* 84.
Lapis CrySTALLUS praeparata. *L. m. m.* 678.

168 MATERIA MED. REGNI MINERALIS.

11. NATRVM *fontanum*. L. *Syst. nat.* 89.

Sal Catharticum Anglicum — obtineri potest ab omni
Aqua Marina. L. m. m. 680.

12. NATRVM *glaciale*. L. *Syst. nat.* 90. Nova Scotia.
Glacies Mariae. L. m. m. 681.

13. BORAX *Granatus*. L. *Syst. nat.* 96. In Saxis Pen-
sylvaniae.
Granatus praeparatus. L. m. m. 684.

14. MVRIA *marina*. L. *Syst. nat.* 98. Mare.
Sal Commune. Spiritus acidus. dulcis. L. m. m. 685.

15. MVRIA *fontana*. L. *Syst. nat.* 98. Fontes falsi pas-
sim in regionibus Ameriae transmontanis.
Sal commune. L. m. m. 686.

16. ALVMEN *commune*. L. *Syst. nat.* 101. Passim in
Saxis schistosis.
Alumen crudum. Vstum. L. m. m. 688.

17. VITRIOLVM *Martis*. L. *Syst. nat.* In pyritis et
fodinis ferri.
Vitriolum Martis commune. Tartarus vitriolatus.
Oleum. Spiritus. Colcothar. L. m. m. 691.

18. VITRIOLVM *plumbi album*.
Saccharum Saturni. (ex Calce plumbi et Aceto.). L.
m. m. 694.

19. AMBRA *ambrosiaca* grisea. L. *Syst. nat.* 101. Mare
Insular. Bahamens. Ambra grisea. L. m. m. 695.

20. BITVMEN *Petroleum*. L. *Syst. nat.* 109. Fontibus
variis innatat.
Petreolum. S. Oleum Petrae. L. m. m. 698.

21. PYRITES *nativus*. L. *Syst. nat.* 113?
Sulphur vivum.

22. PYRITES *Ferri*. *L. Syst. nat.* 115. Frequens in variis partibus.
Sulphur Citrinum. Spiritus per Campanam. Hepar, Tinctura, Flores, Balsamum, Lac. *L. m. m.* 702.
23. ZINCVM *Calaminaris*. *L. Syst. nat.* 126. Pensylvania?
Lapis calaminaris. *L. m. m.* 711.
24. PLVMBVM *Galena*. *L. Syst. nat.* 133. Frequens per totam Americam.
Plumbum ustum. Lithargyr. Cerussa. Minium. *L. m. m.* 715.
25. FERRVM *selectum*, *Haematites*, *Magnes*. *L. Syst. nat.* 137. 140. —
Chalybs. Limatura. Crocus. Tinctura. *L. m. m.* 716.
26. CVPRVM *nativum*. *L. Syst. nat.* 143.
Aes. Vstum. Viride. *L. m. m.* 720.
27. ARGENTVM. *L. Syst. nat.* 148. Rarius adhuc.
Argentum foliatum. Lapis infernalis. *L. m. m.* 723.
28. AVRVM *nativum*?
Arsenicum, *Hydrargyrum*, *Stibium*, *Cobaltum*, *Molybdaenum* et *Stannum*, hucusque in America nondum detecta.
29. CALCVLVS *Margarita*. *L. Syst. nat.* 177. Testae Myae margaritiferae? in variis Pensylvaniae fluviis.
Margaritae. *L. m. m.* 729.
30. TARTARVS *Vini*. *L. Syst. nat.* 178. Dolia Vini.
31. PVMEX *Vulcani*. *L. Syst. nat.* 181. Indiae occidentalis insulae.
Lapis Pumex. *L. m. m.* 732.

170 MATERIA MED. REGNI MINERALIS.

32. OCHRA *ferri*. *L. Syst. nat.* 192. In Acidulis variis et paludibus.

Ochra *nativa*. *L. m. m.* 734.

33. OCHRA *Aeris*. *L. Syst. nat.* 192. Couperos. Ad foudinas Cupri et alia loca frequens.

Viride *montanum*. *L. m. m.* 735.

34. ARGILLÆ *variae* —


35. CALX *Creta*. *L. Syst. nat.* 206?

36. CALX *Gur*. *L. Syst. nat.* 207. In fissuris rupium. Marmor.

Lac *lunae*. *L. m. m.* 741.

37. HUMVS *damascena*. *L. Syst. nat.* 211.











1902

